



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

**EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

**PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं. 1425]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 9, 2009/भाद्र 18, 1931

No. 1425|

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 9, 2009/BHADRA 18, 1931

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2009

का.आ. 2286(अ).—विनाशक कीट और नाशीजीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वनस्पति संग्रह (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 में पुनः संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्—

1. (1) इस आदेश को वनस्पति संग्रह (भारत में आयात का विनियमन) (पहला संशोधन) आदेश, 2009 कहा जाएगा।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

2. वनस्पति संग्रह (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 जिसे उक्त आदेश कहा जाएगा की अनुसूची-6 में—(i) क्रम सं. 30, 44, 49, 83, 141, 152, 154, 155, 159, 180, 223, 262, 266, 319, 345, 355, 383, 387, 405, 406, 418, 419, 484, 575 और उससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्—

क्र. सं.	वनस्पति प्रजाति	वनस्पति सामग्री	उद्गम देश	पादप स्वच्छता प्रमाण-पत्र में सम्मिलित की जानेवाली अपेक्षित अतिरिक्त घोषणाएं	आयात के लिए विशेष शर्तें
					(6)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
30	एन्टीरिनम मेजस प्रजाति (एन्टीरिनम)	बोने के लिए बीज	(1) आस्ट्रेलिया  (ii) यूरोप (यू. के. कोलेटोट्रिकम एन्टीरिनी (एन्थाक्नोस) से मुक्त को छोड़कर)  (iii) ग्वाटेमाला  (iv) यू.के.  (v) यू.एस.ए.	निम्नलिखित से मुक्तिः  (क) कोलेटोट्रिकम एन्टीरिनी (एन्थाक्नोस) (ख) घूसीनिया एन्टीरिनी (स्टट)  (ii) यूरोप (यू. के. कोलेटोट्रिकम एन्टीरिनी (एन्थाक्नोस) से मुक्त को छोड़कर)  (iii) ग्वाटेमाला शून्य  (iv) यू.के.  (v) यू.एस.ए.	संग्रह खरपतवार बीजों एवं मृदा से मुक्ति  संग्रह खरपतवार बीजों एवं मृदा से मुक्ति  संग्रह खरपतवार बीजों एवं मृदा से मुक्ति  संग्रह खरपतवार बीजों एवं मृदा से मुक्ति  निम्नलिखित से मुक्तिः  (क) हेट्रोपटेला एन्टीरिनी (लीफ स्पॉट) (ख) फाइलोस्ट्रिक्टा एन्टीरिनी (स्टेम रूट) (ग) सूडोमोनास एनेनस (बैक्टीरियल लीफ स्पॉट)  निम्नलिखित से मुक्तिः  (क) कोलेटोट्रिकम एन्टीरिनी (एन्थाक्नोस) (ख) हेट्रोपटेला एन्टीरिनी (लीफ स्पॉट) (ग) फाइलोस्ट्रिक्टा एन्टीरिनी (स्टेम रूट) (घ) घूसीनिया एन्टीरिनी (स्टट)	संग्रह खरपतवार बीजों से मुक्ति  संग्रह खरपतवार बीजों से मुक्ति  संग्रह खरपतवार बीजों से मुक्ति
	एन्टीरिनम प्रजाति	बोने के लिए बीज	(i) जापान	शून्य	संग्रह खरपतवार बीजों एवं मृदा से मुक्ति	

44	बोगोनिया प्रजाति  बेटुला (वर्क)	बोने के लिए बीज	(i) यूरोप	डिटाईलेन्चस डिपर्की (हयसिन्च का ब्राउन रिंग रोग)	संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्ति	
			(ii) जापान			
			(iii) उत्तरी अमेरिका			
			(iv) ग्वाटेमाला	सूडोकोकस जैकबीयर्डसली (जैकबीयर्डसली मीली बग)	संगरोध खरपतवार बीजों एवं मृदा से मुक्ति	
			(v) यू.के.	(क) अरबिस मोजाइक वायरस	(i) संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्ति	
			(vi) इटली	(ख) स्ट्राबेरी लेटेन्ट रिंग स्पाट वायरस	(ii) मृदा संदूषण से मुक्ति	
			(vii) जर्मनी	(ग) एस्प्रेगस वायरस-1	(iii) उदगम देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा बीज फसल जांच एवं (क), (ख) और (ग) और (घ) से मुक्ति का प्रमाणीकरण ।	
			(viii) स्पेन	(घ) एस्प्रेगस वायरस-2		
				(ख) स्ट्राबेरी लेटेन्ट रिंग स्पाट वायरस	(i) संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्ति	
				(ख) एकेमोनियम स्ट्रिक्टम से मुक्त	(ii) मृदा संदूषण से मुक्ति	
					(iii) उदगम देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा बीज फसल जांच एवं (क) से मुक्ति का प्रमाणीकरण ।	
49	बेटुला (वर्क)	प्रजाति	छाल सहित/ रहित लकड़ी	(i) यूरोप	एग्रीलस एक्सेस (ब्रेज चर्क बोरर)	एन.ए.पी. के तहत 21 डिग्री सेल्सियस और उससे अधिक या समकक्ष पर 48 ग्राम प्रति घनमीटर पर मिथाइय ब्रोमाइड के साथ 24 घण्टे के लिए या भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण सलाहकार द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित कोई अन्य उपचार उदगम/पुनः निर्यातक देश से जारी पादप रवाच्छता प्रमाण-पत्र पर पृष्ठांकित किया जाना है ।
	बेटुला प्लेटाइफ्राइला ब्रिचवुड डॉवल्ट्स)	छाल रहित	रहित लकड़ी	(iii) चीन	(क) एनोप्लोफोरा चाइनेन्सिर (काले एवं सफेद खट्टे लॉधोर्न (ख) मोनो केमस सूटर (ब्राउन क्रम्बली)	एन.ए.पी. के तहत 21 डिग्री सेल्सियस और उससे अधिक या समकक्ष पर 48 ग्राम प्रति घनमीटर पर मिथाइय ब्रोमाइड के साथ 24 घण्टे के लिए या भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण सलाहकार द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित कोई अन्य उपचार उदगम/पुनः निर्यातक देश से जारी पादप रवाच्छता प्रमाण-पत्र पर पृष्ठांकित किया जाना है ।

<p>83. सिट्रस प्रजाति (संतरा)</p>	<p>(i) आरट्रॉलिया</p>	<p>निम्नलिखित से मुक्ति:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(क) एस्पीडिओट्स नेरी (ओक्यूवा रैफेल)</li> <li>(ख) बैकट्रोसेरा एक्वीलोनिस</li> <li>(ग) बैकट्रोसेरा जर्विसी</li> <li>(घ) बैकट्रोसेरा न्योमेरिलिस</li> <li>(ङ.) बैकट्रोसेरा द्रायोनी</li> <li>(क्वीन्सलैंड फ्रूट फ्लाई)</li> <li>(च) सिरेटाइटिस केपीटाटा (मेडीटेरियन फ्रूट फ्लाई)</li> <li>(छ) एपीफ्यास पोर्टविटाना (लाइट बाउन एपल मॉथ)</li> <li>(ज) ग्यूनेर्डिया सिट्रीकार्पा (सिट्रस ब्लैक स्पॉट)</li> <li>(झ) सूडोकोकस कैलिसयोलेरी (स्कारलेट मीलीबग)</li> <li>(ञ) यूनेस्पिस सिट्री (सिट्रस स्नो रैफेल)</li> </ul>	<p>अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार एस्पीडिओट्स नेरी (ओक्यूवा रैफेल) बैकट्रोसेरा एक्वीलोनिस बैकट्रोसेरा जर्विसी बैकट्रोसेरा न्योमेरिलिस बैकट्रोसेरा द्रायोनी (क्वीन्सलैंड फ्रूट फ्लाई) और सिरेटाइटिस केपीटाटा (भूमध्य फल परजीवी) के लिए नाशीजीव मुक्ति क्षेत्र स्थिति; अथवा</p> <p>(क) एन ए पी पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड या उच्च तापमान पर 2 घंटे के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड या इसके समतुल्य से भूमध्य फल परजीवी और क्वीन्सलैंड फ्रूट फ्लाई के विरुद्ध प्रश्युमन अथवा</p> <p>(ख) भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध प्रशीतन पारगमन के लिए 10 दिन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप: 11 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप: 12 दिन से ज्यादा के लिए 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप पर पोत परिवहन से पूर्व उपचार तथा क्वीन्सलैंड फ्रूट फ्लाई के विरुद्ध प्रशीतन पारगमन के लिए 13 दिन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप पर 14 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 18 दिन के लिए 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप पर पोत परिवहन से पूर्व उपचार।</p>
	<p>(ii) कनाड़ा</p>	<p>निम्नलिखित से मुक्ति:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(क) मेटकाफ्रा प्रूनोसा (फ्रॉस्टेड मॉथ बग)</li> <li>(ख) सूडोकोकस कामरटॉकी (कामरटाक मीलीबग)</li> <li>(ग) सूडोकोकस जैकबीयडीसर्ल (जैकबीयडीसर्ली मीलीबग)</li> </ul>	<p>शून्य</p>

<p>(iii) घिली</p>	<p>निम्नलिखित से मुक्ति:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(क) एस्पीडिओट्स नेरी (ओक्यूबा रकेल)</li> <li>(ख) सिरेटाइट्स केपीटाटा (मेडीटेरियन फ्रूट फ्लाई)</li> <li>(ग) सूडोकोक्स कैलिसयोलेरी (रकारलैट मीलीबग)</li> <li>(घ) सेलनेसियडस आर्टिकुलेट्स (पश्चिम भारतीय रेड रकेल)</li> <li>(ड.) यूनेस्पिस सिट्री (सिट्रस स्नो रकेल)</li> </ul>	<p>अंतराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सिरटाइट्स केपीटाटा (भूमध्य फल परजीवी) के लिए नाशीजीव मुक्ति क्षेत्र स्थिति: अथवा</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(क) एन ए पी पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड या उच्च तापमान पर 2 घंटे के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड या इसके समतुल्य भूमध्य फल परजीवी विरुद्ध प्रदूषन अथवा</li> <li>(ख) भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध प्रशीतन पारगमन के लिए 10 दिन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप: 11 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप: 12 दिन से ज्यादा के लिए 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप पर पोत परिवहन से पूर्व उपचार</li> </ul>
<p>(iv) चीन</p>	<p>निम्नलिखित से मुक्ति:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(क) एस्पीडिओट्स नेरी (ओक्यूबा रकेल)</li> <li>(ख) बैक्ट्रोसेरा टिस्युनियोन्सि (जापानी संतरा फ्लाई)</li> <li>(ग) सेरोप्लास्ट्स जेपोनिक्स (टारटाइस वैक्स रकेल)</li> <li>(घ) यूगनेडिंया सिट्रीकापा (सिट्रस ब्लैक रॉट)</li> <li>(ड.) ओरेशिया एक्सक्वाटा (फ्रूटपीयसिंग मॉथ)</li> <li>(च) सूडोकोक्स कैलिसोलेरी (रकारलैट मीलीबग)</li> <li>(छ) सूडोकोक्स कॉमस्टाकी (कॉमस्टाक मीलीबग)</li> <li>(ज) सूडोकोक्स जेकवीयडीसली मीलीबग (जेकवीयडीसली मीलीबग)</li> <li>(झ) येनेसिप्स सिट्री (सिट्रस स्नो रकेल)</li> <li>(झ) यूनेस्पिस येनोनेन्सिस (एरोहैड रकेल)</li> </ul>	<p>अंतराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बैक्ट्रोसेरा टिस्युनियोन्सि (जापानी संतरा फ्लाई) के लिए नाशीजीव मुक्ति क्षेत्र स्थिति: अथवा</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(क) एन ए पी पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड या उच्च तापमान पर 2 घंटे के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड या इसके समतुल्य भूमध्य फल परजीवी विरुद्ध प्रदूषन अथवा</li> <li>(ख) भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध प्रशीतन पारगमन के लिए 10 दिन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप: 11 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप: 12 दिन से ज्यादा के लिए 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप पर पोत परिवहन से पूर्व उपचार</li> </ul>
<p>(v) क्रांस</p>	<p>निम्नलिखित से मुक्ति:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(क) एस्पीडिओट्स नेरी (ओक्यूबा रकेल)</li> <li>(ख) सिरेटाइट्स केपीटाटा (मेडीटेरियन फ्रूट फ्लाई)</li> <li>(ग) यूगनेडिंया सिट्रीकापा (सिट्रस ब्लैक रॉट)</li> <li>(घ) मेटकाफा प्रूनोसा (फ्रॉस्टेड मॉथ बग)</li> <li>(ड.) सूडोकोक्स कैलिसयोलेरी (रकारलैट मीलीबग)</li> <li>(च) यूनेस्पिस येनोनेन्सिस (एरोहैड रकेल)</li> </ul>	<p>अंतराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सिरटाइट्स केपीटाटा (भूमध्य फल परजीवी) के लिए नाशीजीव मुक्ति क्षेत्र स्थिति: अथवा</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(क) एन ए पी पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड या उच्च तापमान पर 2 घंटे के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड या इसके समतुल्य भूमध्य फल परजीवी विरुद्ध प्रदूषन अथवा</li> <li>(ख) भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध प्रशीतन पारगमन के लिए 10 दिन के लिए 0 डिग्री</li> </ul>



(x) यू.एस.ए.

## निम्नलिखित से मुक्ति:

- (क) एनेस्ट्रेफा फ्रेटरकुलस (दक्षिणी अमेरिका फ्रूटफ्लाई)
- (ख) एनेस्ट्रेफा ल्यूडेन्स (मैक्सीकन फ्रूट फ्लाई)
- (ग) एनरट्रेफा सेर्पेन्टाइना (सैपोडिला फ्रूट फ्लाई)
- (घ) एनरट्रेफा एस्ट्रीआटा (अमरुद फ्रूट फ्लाई)
- (ङ.) एनरट्रेफा सरयेस (फैरीवियन फ्रूट फ्लाई)
- (च) एस्पीडिओटस नेरी (ओक्यूबा रक्केल)
- (छ) सिरटाइटिस केपिटाटा (मेडीटेरियन फ्रूट फ्लाई)
- (ज) एपीफ्यास पोस्टविटाना (लाइट वाउन एप्ल मॉथ)
- (झ) मेटकाप्रा प्रूनोसा (फ्रॉस्टेड मॉथ वग)
- (न) पेनोनाइव्स सिट्री (सिट्रस रेड माइट)
- (ट) पेनोनाइव्स सिट्री (सिट्रस रेड माइट)
- (ठ) सूडोकोक्स कॉमर्स्टाकी
- (ड.) सूडोकोक्स जैकबीयडीसली मीलीवग (जैकबीयडीसली मीलीवग)
- (ढ) सेलेनेस्थिडस आर्टिकुलेटस (पश्चिम भारतीय रेड रक्केल)
- (ण) यूनेस्पिस सिट्री (सिट्रस स्नो रक्केल)

(xi) मिस्र

## निम्नलिखित से मुक्ति:

- (क) सिरटाइटिस केपिटाटा (भूमध्य फल परजीवी)
- (ख) ब्रैपीपेलप्स लेविरी (सिट्रस फ्लंट)

2 घंटे के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड या इसके समतुल्य भूमध्य फल परजीवी और विरुद्ध प्रदूषन अथवा

(ख) भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध प्रशीतन पारगमन के लिए 10 दिन के लिए 0 डिग्री सेन्टीग्रेड या निम्न ताप; 11 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेन्टीग्रेड या निम्न ताप; 12 दिन से ज्यादा के लिए 1.1 डिग्री सेन्टीग्रेड या निम्न ताप पर पोत परिवहन से पूर्व उपचार

अंतराष्ट्रीय मानकों के अनुसार एनेस्ट्रेफा फ्रेटरकुलस (दक्षिणी अमेरिका फ्रूटफ्लाई) एनेस्ट्रेफा ल्यूडेन्स (मैक्सीकन फ्रूट फ्लाई)

एनरट्रेफा सेर्पेन्टाइना (सैपोडिला फ्रूट फ्लाई)

एनरट्रेफा एस्ट्रीआटा (अमरुद फ्रूट फ्लाई)

एनरट्रेफा सरयेस (फैरीवियन फ्रूट फ्लाई) और सिरटाइटिस केपिटाटा (भूमध्य फल परजीवी) के लिए नाशीजीव मुक्ति क्षेत्र स्थिति; अथवा

(क) एन ए पी पर 21 डिग्री सेन्टीग्रेड या उच्च तापमान पर

2 घंटे के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड या इसके समतुल्य भूमध्य फल परजीवी विरुद्ध प्रदूषन अथवा एनेस्ट्रेफा प्रजाति के लिए एन ए पी के लिए 40 ग्राम

(ख) भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध प्रशीतन पारगमन के लिए 10 दिन के लिए 0 डिग्री सेन्टीग्रेड या निम्न ताप; 11

दिन के लिए 0.55 डिग्री सेन्टीग्रेड या निम्न ताप; 12

दिन से ज्यादा के लिए 1.1 डिग्री सेन्टीग्रेड या निम्न ताप पर

पोत परिवहन से पूर्व उपचार 18 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेन्टीग्रेड या निम्न ताप; 18

20 दिन के लिए 1.1 डिग्री सेन्टीग्रेड या निम्न ताप पर पोत परिवहन से पूर्व उपचार

अंतराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सिरटाइटिस केपिटाटा (भूमध्य फल परजीवी) के लिए

नाशीजीव मुक्ति क्षेत्र स्थिति;

			<p>माइट)</p> <p>(ग) स्पाइरोप्लाज्मा सिट्री (खट्टे फलों का दुर्साध्य रोग)</p>	<p>अथवा</p> <p>(क) एन ए पी पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड या उच्च तापमान पर 2 घंटे के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड या इसके समतुल्य भूमध्य फल परजीवी विरुद्ध प्रदूषन अथवा</p> <p>(ख) भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध प्रशीतन पारगमन के लिए 10 दिन के लिए 0 डिग्री सेन्टीग्रेड या निम्न ताप; 11 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 12 दिन से ज्यादा के लिए 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप पर पोत परिवहन से पूर्व उपचार तथा 13 दिन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप पर 14 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 18 दिन के लिए 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप पर पोत परिवहन से पूर्व उपचार उक्त उपचार उदगम/पुनः निर्यातक देश से जारी पादप रखच्छता प्रमाण-पत्र पर पृष्ठांकित किया जाना है।</p>	
			<p>(xii) मोरक्को</p>	<p>(क) सिरटाइटिस केपिटाटा (भूमध्य फल परजीवी)</p> <p>(ख) पेन्टोमॉस सर्विनस (फुलर्स रोज बीटल)</p> <p>(ग) पेरिङ्रोमा सोसिया (पीयर्ली अंडर विंग मॉथ)</p> <p>(घ) स्पाइरोप्लाज्मा सिट्री (खट्टे फलों का दुर्साध्य रोग)</p>	<p>अंतराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सिरटाइटिस केपिटाटा (भूमध्य फल परजीवी) के लिए नाशीजीव मुक्ति क्षेत्र शिखिः अथवा</p> <p>(क) एन ए पी पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड या उच्च तापमान पर 2 घंटे के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड या इसके समतुल्य भूमध्य फल परजीवी विरुद्ध प्रदूषन अथवा</p> <p>(ख) भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध प्रशीतन पारगमन के लिए 10 दिन के लिए 0 डिग्री सेन्टीग्रेड या निम्न ताप; 11 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 12 दिन से ज्यादा के लिए 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप पर पोत परिवहन से पूर्व उपचार तथा 13 दिन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप पर 14 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 18</p>



		(v) यू.के.	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धक पौधों को मातृ स्कन्ध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया और टोमेटो ब्लैक रिंग वायरस से मुक्त रखा गया।	शून्य	
		(vi) जापान, जर्मनी, आर्द्रलिया, यू.के., यूएसए को छोड़कर कोई भी देश	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धक पौधों को मातृ स्कन्ध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया और वायरस से मुक्त रखा गया।	शून्य	
		चीन	कोनेसियम - प्लैसीडम (स्टाट्स पाइन विलस्टर रस्ट से मुक्त)	संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्त	
		(ii) औषधीय प्रयोग के लिए सूखी वनस्पति सामग्री (पौधे के सभी भाँ)		संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्त	
155.	सरनियम प्रजातिल	(i) बोने के लिए बीज	(i) संयुक्त राज्य अमेरिका	शून्य	
			(ii) एशिया		
			(iii) यूरोप		
			(iv) ग्राटेमाला	(क) फेनाकोकस मेंडीरेन्सेस (कैसाव मीठी बग) (ख) सूडोकोकस (जैकबीयर्डसली मिली बग) (ग) स्पोडोप्ट्रा फ्लूरीपर्डा (फॉल आर्मीवार्म)	संगरोध खरपतवार बीजों एवं मृदा से मुक्त
		(ii) उत्तक संवर्धक वनस्पति	(i) संयुक्त राज्य अमेरिका	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धक पौधों को मातृ स्कन्ध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया और निम्नलिखित से मुक्त रखा गया। (क) टोमेटो स्पॉटिड विल्ट वायरस (ख) पेलरगोनियम लाइन पैट्रन कार्मॉ वायरस (ग) पेलरगोनियम रिंग स्पाट वायरस (घ) पेलरगोनियम बीयन विल्यरिंग वायरस (ङ.) पोटेटो वायरस एस (च) इम्पेटीन्स नेकोटिक स्पाट वायरस	शून्य

	(ii) नीदरलैंड	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धक पौधों को मातृ स्कन्ध से प्राप्त किया गया था। इनका परीक्षण किया गया और निम्नलिखित सं मुक्त रखा गया:- (क) पेलरगोनियम लीफ कर्ल वायरस (ख) पेलरगोनियम वीयन नेटिंग वायरस (ग) अरेबिक मोजाइक वायरस (घ) टोमेटो रिंग र्पाट वायरस (ङ.) पोटेटो ब्लैक रिंग वायरस (च) टोबेको नेक्टोसिस वायरस	शून्य
	(iii) कनाडा	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धक पौधों को मातृ स्कन्ध से प्राप्त किया गया था। इनका परीक्षण किया गया और निम्नलिखित सं मुक्त रखा गया:- (क) टोमेटो स्पॉट विल्ट वायरस (ख) इम्पेटीन्स नेक्टोटिक स्पॉट वायरस	शून्य
	(iv) इटली	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धक पौधों को मातृ स्कन्ध से प्राप्त किया गया था। इनका परीक्षण किया गया और निम्नलिखित सं मुक्त रखा गया:- (क) पेलरगोनियम रिंग र्पाट वायरस (ख) पेलरगोनियम क्लोरोटिक रिंग पैट्रॉन वायरस (ग) पेलरगोनियम जोनेट स्पॉट वायरस	शून्य
	(v) ईरान (vi) फ्रांस	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धक पौधों को मातृ स्कन्ध से प्राप्त किया गया था। इनका परीक्षण किया गया और टोमेटो स्पॉटिड विल्ट वायरस से मुक्त रखा गया।	शून्य
	(vii) यू.के.	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धक पौधों को मातृ स्कन्ध से प्राप्त किया गया था। इनका परीक्षण किया गया और पेलरगोनियम लाइन पैट्रॉन कार्मोवायरस से मुक्त रखा गया।	शून्य
	(viii) इंगरी (ix) जर्मनी	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धक पौधों को मातृ स्कन्ध से प्राप्त किया गया था। इनका परीक्षण किया गया और पेलरगोनियम फ्लावर-ब्रेक वायरस से मुक्त रखा गया।	शून्य
	(x) चैक रिपब्लिक	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धक पौधों को मातृ स्कन्ध से प्राप्त किया गया था। इनका परीक्षण किया गया और पेलरगोनियम लीफ कर्ल वायरस से मुक्त रखा गया।	शून्य
	(xi) स्वीडन	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धक पौधों को मातृ स्कन्ध से प्राप्त किया गया था। इनका परीक्षण किया गया और टोमेटो रिंग स्पॉट वायरस से मुक्त रखा गया।	शून्य
	(xii) पौलेंड	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धक पौधों को मातृ स्कन्ध से प्राप्त किया गया था। इनका परीक्षण किया गया और टोबेटो नेक्टोसिस वायरस से मुक्त रखा गया।	शून्य

		(xiii) यू.एस.ए., यू.के.इटली, हंगरी, जर्मनी, नीदरलैंड, देक रिपब्लिक, स्टोकन, पोलैंड, कनाडा को छोड़कर कोई भी देश	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर संबंधक पांचों को सातु रकम से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया और इसे वायरस से मुक्त रखा गया।	शून्य	
159.	गोमफेना प्रजाति (ग्लोबासा)	बोने के लिए बीज	(i) जर्मनी (ii) ताइवान (iii) यू.एस.ए. (iv) नीदरलैंड (v) फ्रांस	शून्य	संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्त
180.	इयोमोइया प्रजाति (कॅगकॉग)	बोने के लिए बीज	(i) जापान (ii) नीदरलैंड (iii) फ्रांस (iv) ताइवान (v) जापान (vi) यू.के. (vii) थाईलैंड	सोयाबीन ड्वाफ वायरस से मुक्त	संगरोध खरपतवार बीजों एवं मृदा से मुक्त संगरोध खरपतवार बीजों एवं मृदा से मुक्त
		(ii) प्रवर्धन के लिए राइजोम्स	(i) जर्मनी (ii) नीदरलैंड (iii) फ्रांस	निम्नलिखित से मुक्त: (क) डिटाईलेन्चस डिस्ट्रक्टर (पोटेटो ट्यूबर नीमाटोड) (ख) डिटाईलेन्चस डिपस्टी (ह्यासिथ ब्राइन रिंग रोग)	(i) मृदा से मुक्त (ii) एक मौसम के लिए उगाने हेतु प्रवेश पश्चात संगरोध
223.	स्प्रोसोटिस प्रजाति	बोने के लिए बीज	(i) यू.एस.ए. (ii) नीदरलैंड	शून्य	संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्त
				फाइटोनेमस पेलिडस (स्ट्रावेरी माइट) से मुक्त	संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्त
262.	पोमफल (सेब, नाशपाती), (पायररस प्रजाति) और कट्टीस (साइडोनिया प्रजाति)	(i) रोपण या प्रवर्धन के लिए कतरने/पोध/ कलियां	कोई भी देश	निम्नलिखित से मुक्त: (क) फायर ब्लाइट (एमीलोबोरा) (ख) क्राउन गाल (एग्रोबेक्टीरियम ट्यूमफेसीन्स) (ग) हेयरी रट (ए.राइजोजीन्स) (घ) एपल एंड पीयर रस्ट (जिम्मोसोरीजियमस्य नान एशियाटिक) (ङ) एपल स्कार स्किन एपल स्टेम ग्रूबींग वायरस (च) सीड केलिसड (मेगारिटिग्मस सप्टोट्राफस) (छ) पोमाइड को प्रभावित करने वाले वायरस/फाइटोप्लाज्म	(i) 1-2 वर्ष की अवधि के लिए उगाने हेतु प्रवेश पश्चात संगरोध (ii) कृषि एवं सहकारिता विभाग पूर्वानुमति शर्त पर वाणिज्यक आयात

	(ii) उत्क संवर्धक वनस्पति	कोई भी देश	प्रमाणित किया जाता है कि उत्क संवर्धक पौधों को मातृ स्कन्द से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया और पोमाइड को प्रभावित करने वाले वायरस और फाइटोलाजम से मुक्त रखा गया।	उक्त (i) पर उल्लिखित शर्त इस पर लागू नहीं होगी।
	(iii) उपभोग के लिए ताजे फल	(i) आरट्रेनिया	निम्नलिखित से मुक्तः (क) बैक्ट्रोसेरा ट्रायोनी (क्वीसलैंड फ्रूट फ्लाई) (ख) सिरेटाइट्स केपीटाटा (भूमध्य फल परजीवी) (ग) साइडिया पोमोनेला (कोडलिंग मॉथ) (घ) एपियास पोर्स्टविटाना (लाइट ब्राउन एपल) मॉथ (ङ) सूडोकोकस केलसियोनेरी (स्कॉरलैट मीली बग)	(क) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बैक्ट्रोसेरा ट्रायोनी (क्वीसलैंड फ्रूट फ्लाई) और सिरेटाइट्स केपीटाटा (भूमध्य फल परजीवी) के लिए नाशीजीव मुक्ति क्षेत्र स्थिति; अथवा (ख) भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध प्रशीतन पारगमन के लिए 10 दिन के लिए 0 डिग्री सेन्टीग्रेड या निम्न ताप; 11 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेन्टीग्रेड या निम्न ताप; 12 दिन से ज्यादा के लिए 1.1 डिग्री सेन्टीग्रेड या निम्न ताप पर परिवहन से पूर्व उपचार तथा क्वीसलैंड फ्रूट फ्लाई के विरुद्ध 13 दिन के लिए 0 डिग्री सेन्टीग्रेड या निम्न ताप पर 14 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेन्टीग्रेड या निम्न ताप; 18 दिन के लिए 1.1 डिग्री सेन्टीग्रेड या निम्न ताप पर पोत परिवहन से पूर्व उपचार
	(ii) कर्नाटा	निम्नलिखित से मुक्तः (क) साइडिया मोलेस्टा (ओरिएन्टल फ्रूट मॉथ) (ख) एर्विनिया एमीलोवोरा (फायर ब्लाइट) (ग) पेन्डेमिस हेप्राना (एपल ब्राउन टार्टिंक्स) (घ) पेरीड्रोमा सोशिया (पीयर्ली अंडरविंग मॉथ) (ङ) सूडोकोकस कोमरस्टकी (कोमरस्टक मीलीबग) (च) रेगोलेटिस पोमोनेला (एपल मेर्गॉट)	(क) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार रेगोलेटिस पोमोनेला (एपल मेर्गॉट) के लिए नाशीजीव मुक्ति क्षेत्र स्थिति; अथवा (ख) रेगोलेटिस पोमोनेला (एपल मेर्गॉट) प्रशीतन पारगमन के लिए 10 दिन के लिए 0 डिग्री सेन्टीग्रेड या निम्न ताप; 11 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेन्टीग्रेड या निम्न ताप; 12 दिन से ज्यादा के लिए 1.1 डिग्री सेन्टीग्रेड या निम्न ताप पर पोत परिवहन से पूर्व उपचार	

	(iii) चिली	(क) सिरेटाइट्स केपीटाटा (भूमध्य फल परजीवी) से मुक्त  (क) अंतराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सिरेटाइट्स केपीटाटा (भूमध्य फल परजीवी) के लिए नाशीजीव मुक्ति क्षेत्र स्थिति; अथवा (ख) भूमध्य फल परजीवी प्रशीतन पारगमन के लिए 10 दिन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 11 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 12 दिन से ज्यादा के लिए 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप पर पोत परिवहन से पूर्व उपचार
	(iv) चीन	निम्नलिखित से मुक्तः (क) एडोसोफ्यास ओराना (समर फ्रूट टोट्रिक्स) (ख) साइडिया फ्लूनेब्राना (रेड फ्लम मेगॉट) (ग) साइडिया इनोफिनाटा (मन्चूनियन फ्लूटमॉथ) (घ) साइडिया मोलेस्टा (ओरिएन्टल फ्रूट मॉथ) (ङ) साइडिया पोमेनेला (काडलिंग मॉथ) (च) पेंडेमिस सेरेसाना (कामन ट्रिवर्स मॉथ) (छ) पेंडेमिस हैप्राना (एपल ब्राउन टार्टिक्स) (ज) पेरीद्रोमा सोशिया (पीयर्ली अंडरविंग मॉथ)
	(v) फ्रांस	निम्नलिखित से मुक्तः (क) एडोसोफ्यास ओराना (समर फ्रूट टोट्रिक्स) (ख) सिरेटाइट्स केपीटाटा (भूमध्य फल परजीवी) (ग) साइडिया फ्लूनेब्राना (रेड फ्लम मेगॉट) (घ) साइडिया मोलेस्टा (ओरिएन्टल फ्रूट मॉथ) (ङ) साइडिया पोमेनेला (काडलिंग मॉथ) (च) एर्वियाना एमीलोवोरा (फायर ब्लाइट) (छ) पेंडेमिस हैप्राना (एपल ब्राउन टार्टिक्स) (ज) पेरीद्रोमा सोशिया (पीयर्ली अंडरविंग मॉथ) (झ) सूडाकोकस केलिसओलेरी (स्कारलैट मीलीबग)
	(vi) इरान	साइडिया पोमोनेला (काडलिंग मॉथ) से मुक्त

	(vii) चूजीलेंड	निम्नलिखित से मुक्तः (क) साइडिया मोतेस्टा (ओरिएन्टल फ्रूट मॉथ) (ख) साइडिया पोमेनेला (काडलिंग मॉथ) (ग) एपीफ्यास पोरस्टविटाना (लाइट ब्राउन एपल मॉथ) (घ) एर्विन्याना एमीलोवोरा (फायर ब्लाइट) (ङ.) सूडोकोकस केलिसओलेरी (स्कारलैट मीलीबग)	शूच्य
	(viii) दक्षिणी अफ्रीका	निम्नलिखित से मुक्तः (क) सिरेटाइट्स केपीटाटा (भूमध्य फल परजीवी) (ख) सिरेटाइट्स रोजा (नेटल फ्रूटफ्लाइ) (ग) साइडिया मोतेस्टा (ओरिएन्टल फ्रूट मॉथ) (घ) साइडिया पोमेनेला (काडलिंग मॉथ) (ङ.) एर्विन्याना एमीलोवोरा (फायर ब्लाइट) (च) सूडोकोकस केलिसओलेरी (स्कारलैट मीलीबग)	(क) अंतराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सिरेटाइट्स केपीटाटा (भूमध्य फल परजीवी) के लिए नाशीजीव मुक्ति क्षेत्र स्थिति; अथवा (ख) भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध के प्रशीतन पारगमन के लिए 10 दिन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 11 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 12 दिन से ज्यादा के लिए 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप पर पोत परिवहन से पूर्व उपचार
	(ix) संयुक्त राज्य अमेरिका	निम्नलिखित से मुक्तः (क) सिरेटाइट्स केपीटाटा (भूमध्य फल परजीवी) (ख) सिडिया पोमेनेला (काडलिंग मॉथ) (ग) एपीफ्यास पोरस्टविटाना (लाइट ब्राउन एपल) मॉथ (घ) एर्विन्याना ऐमाइलोवोरा (फोटेंब्लाइट) (ङ.) सूडोकोकस केलिसियोनेरी (स्कारलैट मीली बग) (च) सूडोकोकस काम्स्टॉकी (काम्स्टॉक मीली बग) (छ) रेगोलटिस पोमेनेला (एपल मेगॉट)	(क) अंतराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सिरेटाइट्स केपीटाटा (भूमध्य फल परजीवी) और रेगोलटिस पोमेनेला (एपल मेगॉट) के लिए नाशीजीव मुक्ति क्षेत्र स्थिति; अथवा (ख) एन ए पी पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड या उच्च तापमान पर 2 घंटे के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड या इसके समतुल्य भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध उपचार; अथवा (ग) भूमध्य फल परजीवी और रेगोलटिस पोमेनेला (एपल मेगॉट) के विरुद्ध प्रशीतन पारगमन के लिए 10 दिन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 11 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 12 दिन से ज्यादा के लिए 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप पर पोत परिवहन से पूर्व उपचार।
	(x) इटली	निम्नलिखित से मुक्तः (क) एडोक्सोफ्यास ओराना (समर फ्रूट टोर्टिफ्स) (ख) सिरेटाइट्स केपीटाटा (भूमध्य फल परजीवी) (ग) साइडिया फ्यूनेब्राना	(क) अंतराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सिरेटाइट्स केपीटाटा (भूमध्य फल परजीवी) के लिए नाशीजीव मुक्ति क्षेत्र स्थिति; अथवा (ख) भूमध्य फल परजीवी के

एपल (भेलक्स डोमेनिका)	उपभोग के लिए ताजे फल	(i) संयुक्त राज्य अमेरिका	<p>(रेड प्लम मेंगॉट)</p> <p>(घ) साइडिया मोलेस्टा</p> <p>(ओरियन्टल फ्रूट मॉथ)</p> <p>(झ) एर्वियाना एमीलोवोरा (फायर ब्लाइट)</p> <p>(च) पेन्डिमिस सेरासाना (कामन ट्रिवर्स मॉथ)</p> <p>(छ) पेंडेमिस हैप्राना (एपल ब्राउन टार्टिक्स)</p> <p>(ज) पेरीद्रोमा सोशिया (पीयरली अंडरविंग मॉथ)</p> <p>(झ) सूडोकोकस केलिसओलेरी (स्कारलैट मीलीबग)</p>	<p>विरुद्ध मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई के प्रशीतन पारगमन के लिए 10 दिन के लिए 0 डिग्री सेन्टीग्रेड या निम्न ताप, 11 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 12 दिन से ज्यादा के लिए 1.1 डिग्री सेंटग्रेड या निम्न ताप पर पोत परिवहन से पूर्व उपचार</p>
		(ii) ब्राजील	<p>निम्नलिखित से मुक्ति:</p> <p>(क) सिरेटाइट्स केपीटाटा (भूमध्य फल परजीवी)</p> <p>(ख) साइडिया पोमेनेला (काडलिंग मॉथ)</p> <p>(ग) एपीफ्यास पोस्टविटाना (लाइट ब्राउन एपल मॉथ)</p> <p>(घ) एर्वियाना एमीलोवोरा (फायर ब्लाइट)</p> <p>(झ.) सूडोकोकस केलिसओलेरी (स्कारलैट मीलीबग)</p> <p>(च) सूडोकोकस कोमस्टकी (कोमस्टक मीलीबग)</p> <p>(छ) रेगोलेटिस पोमोनेला (एपल मेंगॉट)</p> <p>(ज) एनेस्ट्रेफ़ा फ्रेक्टरकुलस (दक्षिण अमेरिकी फल परजीवी)</p> <p>(झ) एनेस्ट्रेफ़ा ल्यूडन्या (मेक्सीकन फल परजीवी)</p> <p>(अ) एनेस्ट्रेफ़ा सर्पेन्टिना (सेपोडिला फल परजीवी)</p> <p>(ट) एनेस्ट्रेफ़ा सर्पेन्सा (केरीबीन फल परजीवी)</p> <p>(ठ) एन्थोनोमस क्वार्ड्रिगीबस (एपल कर्कशूलियो)</p> <p>(ड) एपिडाएप्सिस लेपेरी (यूरोपियन पीयर रकेल)</p> <p>(इ) ग्रेफोलिटा मोलेस्टा (आरियन्टल फ्रूट मॉथ)</p> <p>निम्नलिखित से मुक्ति:</p> <p>(क) एनेस्ट्रेफ़ा फ्रेक्टरकुलस (दक्षिण अमेरिकी फल परजीवी)</p> <p>(ख) एनेस्ट्रेफ़ा मेडिटेरियन (सेपोडिला फ्रूट फ्लाई)</p> <p>(ग) सिरेटाइट्स केपीटाटा (भूमध्य फल परजीवी)</p> <p>(घ) ग्रेफोलिटा मोलेस्टा (ओरियन्टल फ्रूट मॉथ)</p> <p>(झ.) हरमोनिया एक्सीराइडिस (हरलेक्सीन लेडी वर्डी)</p> <p>(च) एपलस रेम चिटिंग वायरस (एपलस र्पाई 227 एपीनेस्ट्री और डीकलाइन)</p> <p>(छ) पेरीद्रोमा सोशिया (पीयरली अंडरविंग मॉथ)</p>	<p>(क) अंतराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सिरेटाइट्स केपीटाटा (भूमध्य फल परजीवी) के लिए नाशीजीव मुक्ति क्षेत्र स्थिति; अथवा</p> <p>(ख) भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई के प्रशीतन पारगमन के लिए 10 दिन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 11 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 12 दिन से ज्यादा के लिए 1.1 डिग्री सेंटग्रेड या निम्न ताप पर पोत परिवहन से पूर्व उपचार</p> <p>(क) अंतराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सिरेटाइट्स केपीटाटा (भूमध्य फल परजीवी) के लिए नाशीजीव मुक्ति क्षेत्र स्थिति; अथवा</p> <p>(ख) भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई के प्रशीतन पारगमन के लिए 10 दिन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 11 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 12 दिन से ज्यादा के लिए 1.1 डिग्री सेंटग्रेड या निम्न ताप पर पोत परिवहन से पूर्व उपचार उक्त उपचार उदागम/पुनःनियांतक देश से जारी प्रमाण-पत्र पर पृष्ठांकित किया जाना है।</p>

				(iii) पौलेंड	<p>दिन से ज्यादा के लिए 1.1 डिग्री सेंट्रेग्रेड या निम्न ताप पर पोत परिवहन से पूर्व उपचार उक्त उपचार उदगम/पुनः नियांतक देश से जारी प्रमाण-पत्र पर पृष्ठांकित किया जाना है।</p>
266.	सूडोल्सुगा मेन्सीसी (डोगलस फर कोन)	बिना तने की लकड़ी	(i) चीन (ii) अमेरिका	उत्तरी	<p>निम्नलिखित से मुक्ति:</p> <p>(क) एडोक्सोफ्यास ओराना (समरफ्रूट टोट्रिस)</p> <p>(ख) एमेटेस्टेजिया</p> <p>(ग) आरकिप्स ओडाना (ग्रेट ब्राउन ट्रुविस्ट मॉथ)</p> <p>(घ) विट्रस टोमेंटोसस (रसभरी बीटल)</p> <p>(ड.) एपीडिलिप्स लेपेरी (यूरोपियन पियर रक्केल)</p> <p>(च) ग्रेफोलेटा फ्यूनब्राना (रेड पिलम्ब मेगाट)</p> <p>(छ) ओरथोसिया सिरसी (कोमन ब्येकर)</p> <p>(अ) पेरीझोमा सोसिया (पियरली अंडरविंग मॉथ)</p> <p>(ज) एर्वीनिया एमीलोबोरा (फायर ब्लाइट)</p> <p>(ज) एपलस स्टेम पिटिंग वायरस (एप्पलस स्पाई 227 एपीनेस्ट्री और डीकलाइन)</p>
				(iii) न्यूजीलैंड	<p>दिन से ज्यादा के लिए 1.1 डिग्री सेंट्रेग्रेड या उच्च तापमान पर 2 घंटे के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर निथाइल ब्रोमाइड या इसके समतुल्य से अथवा भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण सलाहकार महोदय द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपचार उक्त उपचार उदगम/पुनः नियांतक देश से जारी प्रमाण-पत्र पर पृष्ठांकित किया जाना है।</p> <p>एन ए पी पर 21 डिग्री सेंट्रेग्रेड या उच्च तापमान पर 2 घंटे के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर निथाइल ब्रोमाइड या इसके समतुल्य से अथवा भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण सलाहकार महोदय द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपचार उक्त उपचार उदगम/पुनः नियांतक देश से जारी प्रमाण-पत्र पर पृष्ठांकित किया जाना है।</p> <p>एन ए पी पर 21 डिग्री सेंट्रेग्रेड या उच्च तापमान पर 2 घंटे के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर निथाइल ब्रोमाइड या इसके समतुल्य से अथवा भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण सलाहकार महोदय द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपचार उक्त उपचार उदगम/पुनः नियांतक देश से जारी प्रमाण-पत्र पर पृष्ठांकित किया जाना है।</p>

		उत्तक संवर्धक वनस्पति	(i) यू.एस.ए.	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धक पौधों को मातृ स्फन्द्य से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया और इसे वायरस से मुक्त रखा गया।	शून्य
319.	वाइटिस विनिफ्रेरा (अंगूर)	जड़ वाले पौधे/कलियां (तने/कतरने)/पौध	कोई भी देश	निम्नलिखित से मुक्ति: (क) ग्रेपवाइन फाइलोक्सेरा या वाइन हाउस (वाइटियस विटिफोलिया डेक्टुलोस्कायरा विटिफोलिया) (ख) रस्ट (फ्रेकोप्सोरा वाइटिस) (ग) डैड आर्म (क्रिटोप्सोरेलाकिटिकोला फोमोप्सिस विटिकोला) (घ) क्राउन गाल (एग्रोवेक्टीरियम विटिस) (ङ) ग्यूमोसिस (पेन्टोपा एन्लोमेरन्स) (च) हेयरी रुट (एग्रोवेक्टीरियम राइजोजीन्स) (छ) पीयर्स रोग (जाइलेला फास्टीडिओसा) (ज) बेक्टीरियल नेक्रोसिस (जाइलोफिलस एन्चेलिन्स) (झ) ग्रेपवाइन वायरस (ल्यूटोवायरस, नेपोवायरस, क्लोरोवायरस, ट्रिकोवायरस, पाटीवायरस	(i) 1 वर्ष की अवधि के लिए उगाने हेतु प्रदेश पश्चात संगरोध (ii) कृषि एवं सहकारिता विभाग पूर्वानुमति शर्त पर वाणिज्यक आयात
	उपभोग के लिए ताजा फल	(i) अफगानिस्तान	शून्य	शून्य	(क) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बैक्ट्रोसेरा द्रायोनी (ब्वीसलैंड फ्रूट फ्लाई) और सिरटाइटिस कोमिटाटा (भूमध्य फल परजीवी) के लिए नाशीजीव मुक्ति क्षेत्र स्थिति; अथवा (ख) एन ए पी प 21 डिग्री सेंटीग्रेड या उच्च तापमान पर 2 घंटे के लिए 40 ग्राम प्रति घन मीटर भिथाइल ब्रोमाइड या इसके समतुल्य भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध उपचार; अथवा (ग) भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध प्रशीतन धारगमन के लिए 10 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 11 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 12 दिन से ज्यादा के लिए 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप पर पोत परिवहन से पूर्व उपचार तथा ब्वीसलैंड फ्रूट फ्लाई के विरुद्ध 13 दिन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 14 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 18 दिन के लिए 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप पर पोत परिवहन से पूर्व उपचार

		(iii) कनाडा	<p>निम्नलिखित से मुक्ति:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(क) फ्रैंकलिनीला ऑसिडेन्टेलिस (पश्चिमी फ्लॉवर थ्रिप्स)</li> <li>(ख) पेरीझोमा सोशिया (पीयली अंडरविंग मॉथ)</li> <li>(ग) स्पोडोप्ट्रा फ्रूगीपडा (फाल आर्मीवार्म)</li> </ul>	<p>(क) अंतराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बैयट्रोसेरा द्रायोनी (क्वीसलैंड फ्रूट फ्लाइ) और सिरटाइटिस केपिटाटा (भूमध्य कल परजीवी) के लिए नाशीजीव मुक्ति क्षेत्र स्थिति; अथवा</p> <p>(ख) एन ए पी पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड या उच्च तापमान पर 2 घंटे के लिए 40 ग्राम प्रति घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड या इसके समतुल्य भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध उपचार; अथवा</p> <p>(ग) भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध प्रशीतन पारगमन के लिए 10 दिन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 11 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 12 दिन से ज्यादा के लिए 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप पर पोत परिवहन से पूर्व उपचार तथा क्वीसलैंड फ्रूट फ्लाइ के विरुद्ध 13 दिन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप पर 14 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 15 दिन के लिए 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप पर पोत परिवहन से पूर्व उपचार</p>
		(iv) चिली	<p>निम्नलिखित से मुक्ति:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(क) एस्पीडिओटस नेरी (ओक्यूवा रक्फेल)</li> <li>(ख) सिरटाइटिस केपिटाटा (भूमध्य फल परजीवी)</li> <li>(ग) फ्रैंकलिनीला ऑसिडेन्टेलिस (पश्चिमी फ्लॉवर थ्रिप्स)</li> <li>(घ) पेरीझोमा सोशिया (पीयली अंडरविंग मॉथ)</li> <li>(ङ) सूडोकोक्सकेल्सओलेरी (स्कारलैट मीलीबग)</li> <li>(च) सेलेन्सपिडस आर्टिकुलेटस (पश्चिमी भारतीय रैंड स्फेल)</li> </ul>	<p>(क) अंतराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सिरटाइटिस केपिटाटा (भूमध्य फल परजीवी) के लिए नाशीजीव मुक्ति क्षेत्र स्थिति; अथवा</p> <p>(ख) एन ए पी पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड या उच्च तापमान पर 2 घंटे के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड या इसके समतुल्य भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध उपचार; अथवा</p> <p>(ग) भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध प्रशीतन पारगमन के लिए 10 दिन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 11 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 12 दिन से ज्यादा के लिए 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप पर पोत परिवहन से पूर्व उपचार</p>
		(v) चीन	<p>निम्नलिखित से मुक्ति:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(क) एस्पीडिओटस नेरी (ओक्यूवा रक्फेल)</li> <li>(ख) पेरीझोमा सोशिया (पीयली अंडरविंग मॉथ)</li> <li>(ग) सूडोकोक्सकेल्सओलेरी (स्कारलैट मीलीबग)</li> </ul>	<p>(क) अंतराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सिरटाइटिस केपिटाटा (भूमध्य फल परजीवी) के लिए नाशीजीव मुक्ति क्षेत्र स्थिति; अथवा</p> <p>(ख) एन ए पी पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड या उच्च तापमान पर</p>

				2 घंटे के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड या इसके समतुल्य भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध उपचार; अथवा (ग) भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध प्रशीतन पारगमन के लिए 10 दिन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 11 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 12 दिन से ज्यादा के लिए 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप पर पोत परिवहन से पूर्व उपचार
		(vi) फ्रांस	निम्नलिखित से मुक्ति: (क) एस्पीडिओट्स नेरी (ओक्यूवा स्फेल) (ख) सिरेटाइट्स केपिटाटा (भूमध्य फल परजीवी) (ग) प्रैकलिनीला ओसिडेन्टेलिस (पश्चिमी फ्लावर थिप्स) (घ) पेरीड्रोमा सोरिशया (पीयर्टी अंडरविंग मॉथ) (ङ.) सूडाकोकसकेल्सओलेरी (स्कारलेट भीलीबग) (च) लोविशिया बोद्राना (ब्रेप बेरी मॉथ)	(क) अंतराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सिरटाइट्स केपिटाटा (भूमध्य फल परजीवी) के लिए नाशीजीव मुक्ति क्षेत्र स्थिति; अथवा (ख) एन ए पी पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड या उच्च तापमान पर 2 घंटे के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड या इसके समतुल्य भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध उपचार; अथवा (ग) भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध प्रशीतन पारगमन के लिए 10 दिन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 11 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 12 दिन से ज्यादा के लिए 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप पर पोत परिवहन से पूर्व उपचार
		(vii) ईरान	निम्नलिखित से मुक्ति: (क) एस्पीडिओट्स नेरी (ओक्यूवा स्फेल) (ख) लोविशिया बोद्राना (ब्रेप बेरी मॉथ)	(क) अंतराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सिरटाइट्स केपिटाटा (भूमध्य फल परजीवी) के लिए नाशीजीव मुक्ति क्षेत्र स्थिति; अथवा (ख) एन ए पी पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड या उच्च तापमान पर 2 घंटे के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड या इसके समतुल्य भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध उपचार; अथवा (ग) भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध प्रशीतन पारगमन के लिए 10 दिन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 11 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 12 दिन से ज्यादा के लिए 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप पर पोत परिवहन से पूर्व उपचार

		(viii) इटली	<p>निम्नलिखित से मुक्ति:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(क) अरेबिक मोजाइक वायरस (हॉप बेयरबाइन)</li> <li>(ख) एस्पीडिओटस नेरी (ओक्यूवा रकेल)</li> <li>(ग) सिरेटाइट्स केपीटाटा (भूमध्य फल परजीवी)</li> <li>(घ) फ्रैकलिनीला ओसिडेन्टेलिस (पश्चिमी फ्लावर ड्रिप्स)</li> <li>(ङ.) पेरीझोमा सोशिया (पीयर्ली अंडरविंग मॉथ)</li> <li>(च) फाइटोनेमस पेलिडस (स्ट्रोबेरी माइट)</li> <li>(छ) सूडोकोकसफेल्सओलेरी (रकारलैट मीलीबग)</li> <li>(ज) लोबेशिया बोद्राना (ग्रेप बेरी मॉथ)</li> </ul>	<p>(क) अंतराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सिरटाइट्स केपीटाटा (भूमध्य फल परजीवी) के लिए नाशीजीव मुक्ति क्षेत्र स्थिति; अथवा</p> <p>(ख) एन ए पी पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड या उच्च तापमान पर 2 घंटे के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड या इसके समतुल्य भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध उपचार; अथवा</p> <p>(ग) भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध प्रशीतन पारगमन के लिए 10 दिन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 11 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 12 दिन से ज्यादा के लिए 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप पर पोत परिवहन से पूर्व उपचार</p>
		(ix) न्यूजीलैंड	<p>निम्नलिखित से मुक्ति:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(क) एस्पीडिओटस नेरी (ओक्यूवा रकेल)</li> <li>(ख) फैलपिट्रीनेरस वाइट्स (ग्रेप लीफ रस्ट माइट)</li> <li>(ग) एपियरस पोस्टविटाना (लाइट ब्राउन एपल) मॉथ</li> <li>(घ) फ्रैकलिनीला ओसिडेन्टेलिस (पश्चिमी फ्लावर ड्रिप्स)</li> <li>(ङ.) पेरीनाइचर्स रिट्री (सिट्रस रेड माइट)</li> <li>(च) सूडोकोकसफेल्सओलेरी (रकारलैट मीलीबग)</li> <li>(छ) सूडोकोकस लॉगीस्पाइनस (लंबी पूँछ वाले मीलीबग)</li> </ul>	<p>(क) अंतराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बैक्ट्रोसेरा ट्रायोनी (कर्मिसलैंड फ्रूट फ्लाई) और सिरटाइट्स केपीटाटा (भूमध्य फल परजीवी) के लिए नाशीजीव मुक्ति क्षेत्र स्थिति; अथवा</p> <p>(ख) एन ए पी पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड या उच्च तापमान पर 2 घंटे के लिए 40 ग्राम प्रति घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड या इसके समतुल्य भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध उपचार; अथवा</p> <p>(ग) भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध प्रशीतन पारगमन के लिए 10 दिन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 11 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 12 दिन से ज्यादा के लिए 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप पर पोत परिवहन से पूर्व उपचार तथा कर्मिसलैंड फ्रूट फ्लाई के विरुद्ध 13 दिन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप पर 14 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 18 दिन के लिए 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप पर पोत परिवहन से पूर्व उपचार</p>

		(x) अप्रीका	दक्षिणी निम्नलिखित से मुक्तः— (क) सिरेटाइट्स केपीटाटा (भूमध्य फल परजीवी) (ख) सिरेटाइट्स रोजा (नेटल फ्रूटफलाई) (ग) फ्रैंकलिनीला ओसिडेन्टेलिस (पश्चिमी फलावर शिप्स) (घ) सूडाकोकसकेल्सओलेरी (स्कारलैट मीलीबग) (ङ.) सिर्टेशिप्स औरेंटी (दक्षिणी अप्रीका निम्न शिप्स)	(क) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सिरेटाइट्स रोजा (नेटल फ्रूटफलाई) और सिरेटाइट्स केपीटाटा (भूमध्य फल परजीवी) के लिए नाशीजीव मुक्ति क्षेत्र स्थिति; अथवा (ख) एन ए पी पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड या उच्च तापमान पर 2 घंटे के लिए 40 ग्राम प्रति घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड या इसके समतुल्य भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध उपचार; अथवा (ग) भूमध्य फल परजीवी और सिरेटाइट्स रोजा (नेटल फ्रूटफलाई) के विरुद्ध प्रशीतन पारगमन के लिए 10 दिन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 11 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 12 दिन से ज्यादा के लिए 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप पर पोत परिवहन से पूर्व उपचार
		(xi) यू.एस.ए.	दक्षिणी निम्नलिखित से मुक्तः— (क) ऐस्ट्रेफा फ्रेटरकुलस (दक्षिणी अमरीकी फ्रूटफलाई) (ख) एम्पीडिओट्स नेरी (ओकयूआ रकेल) (ग) सिरेटाइट्स केपीटाटा (भूमध्य फल परजीवी) (घ) एपियास पोस्टविटाना (लाइट ब्राउन एपल) मॉथ (ङ.) फ्रैंकलिनीला ओसिडेन्टेलिस (पश्चिमी फलावर शिप्स) (च) पेनोनाइच्स सिट्री (सिद्रस रेड माइट) (छ) पेरीझोमा सोशिया (पीयरी अंडरविंग मॉथ) (ज) सूडाकोकसकेल्सओलेरी (स्कारलैट मीलीबग) (झ) सेलेनसपिड्स आर्टिकुलेट्स (पश्चिम भारतीय रेड स्केल)	(क) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ऐस्ट्रेफा फ्रेटरकुलस (पश्चिमी अमरीकी फ्रूटफलाई) और सिरेटाइट्स केपीटाटा (भूमध्य फल परजीवी) के लिए नाशीजीव मुक्ति क्षेत्र स्थिति; अथवा (ख) एन ए पी पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड या उच्च तापमान पर 2 घंटे के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड या इसके समतुल्य भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध उपचार; ऐस्ट्रेफा फ्रेटरकुलस (दक्षिणी अमरीकी फ्रूटफलाई) एन ए पी पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड या उच्च तापमान पर 2 घंटे के लिए 40 ग्राम प्रति घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड या इसके समतुल्य भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध उपचार; अथवा (ग) भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध प्रशीतन पारगमन के लिए 10 दिन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 11 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 12 दिन से ज्यादा के लिए 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप पर पोत परिवहन से पूर्व उपचार तथा ऐस्ट्रेफा फ्रेटरकुलस के विरुद्ध 18 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 20 दिन के लिए 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप पर पोत परिवहन से पूर्व उपचार

			(xii) मिस्त्र	<p>निम्नलिखित से मुक्ति:</p> <p>(क) एस्पीडीयोटेस नीरी (आतिपीताम स्केल)</p> <p>(ख) सिरटाइटिस कैपिटाटा (भूमध्य फल परजीवी)</p> <p>(ग) हर्मोनिया एक्स्ट्रीराइडिस (हर्सलेक्सिन लेडीबर्डी)</p> <p>(घ) लोबेशिया बोट्राना (ग्रेप बेरी मॉथ)</p> <p>(ङ)ओटिओरिन्चस सलकेट्स (वाइन वीयिल)</p> <p>(च) ड्रेवीपेल्पस लेविसी (सिट्रसफ्लै )</p> <p>(छ)फ्राइटोफ्रॉथोरा क्रिप्टोगी (टोमेटोफुट रॉट)</p> <p>(ज) ग्रेपवाइन फैनलीफ वायरस (ग्रेपवाइन कोर्ट न्यू वायरस)</p> <p>(स) पीच रोसेट मोजाइक वायरस (रोसेट मोजाइक ऑफ पीच)</p> <p>(अ) टोमेटो रिंगस्पाट वायरस (रिंग स्पॉट ऑफ टोमेटो)</p>	<p>(क) अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सिरटाइटिस कैपिटाटा (भूमध्य फल परजीवी) के लिए नाशीजीव मुक्ति क्षेत्र स्थिति; अथवा</p> <p>(ख) एन ए पी पर 21 डिग्री सेन्टीग्रेड या उच्च तापमान पर 2 घंटे के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड या इसके समतुल्य भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध उपचार; अथवा</p> <p>(ग) भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध प्रशीतन पारगमन के लिए 10 दिन के लिए 0 डिग्री सेन्टीग्रेड या निम्न ताप; 11 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेन्टीग्रेड या निम्न ताप पर पोत परिवहन से पूर्व उपचार तथा 13 दिन के लिए</p>
			(xii) मोरक्को	<p>निम्नलिखित से मुक्ति:</p> <p>(क) एस्पीडीयोटेस नीरी (औक्यूबा स्केल)</p> <p>(ख) सिरटाइटिस कैपिटाटा (भूमध्य फल परजीवी)</p> <p>(ग) लोबेशिया बोट्राना (ग्रेप बेरी मॉथ)</p> <p>(घ) पेरीड्रोमा सोशिया (पीयर्ली अंडरविंग मॉथ)</p> <p>(ङ) सूडोकोक्स कैलिसियोलेरिया (रकारलैट भीलीबग)</p> <p>(ज) ग्रेपवाइन फैनलीफ वायरस (ग्रेपवाइन कोर्ट न्यू वायरस)</p>	<p>(क) अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सिरटाइटिस कैपिटाटा (भूमध्य फल परजीवी) के लिए नाशीजीव मुक्ति क्षेत्र स्थिति; अथवा</p> <p>(ख) एन ए पर 21 डिग्री सेन्टीग्रेड या उच्च तापमान पर 2 घंटे के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड या इसके समतुल्य भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध उपचार; अथवा</p> <p>(ग) भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध प्रशीतन पारगमन के लिए 10 दिन के लिए 0 डिग्री सेन्टीग्रेड या निम्न ताप; 11 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेन्टीग्रेड या निम्न ताप पर पोत परिवहन से पूर्व उपचार तथा 13 दिन के लिए</p>

				० डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; प्रशीतन पारगमन के लिए 14 दिन के लिए ०.५५ डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; १८ दिन के लिए १.१ डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप पर पोत परिवहन से पूर्व उपचार । उक्त उपचार उद्गमदेश/पुनः निर्यातकर्ता देश से जारी पादप स्वच्छता प्रमाण-पत्र पर पृष्ठांकित किया जाना चाहिए ।
(iii) उपयोग के लिए रेसिन्स (सूखे अंगूर)	कोई भी देश			एन ए फी पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड या उच्च तापमान पर 24 घंटे के लिए १६ ग्राम प्रति घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड या इसके समतुल्य से अथवा भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपचार उद्गम/पुनः निर्यातक देश से जारी प्रमाण-पत्र पर पृष्ठांकित किया जाना है ।
(iv) औषधीय उपयोग के लिए बीज (सूखे)	फ्रांस	शून्य		(क) खरपतवार से मुक्त फसल/क्षेत्र प्रमाणीकरण या (ख) पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र में संग्राह खरपतवार बीजों के संबंध में जीरो डोकेज प्रमाणीकरण या १५ मिनट के लिए १२० डिग्री सेंटीग्रेड पर उच्च उपचार द्वारा बीजों को निर्जीव कर 'टेना' अथवा भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपचार (ग) भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण सलाहकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार आयात परेषण का हैंडलिंग आवाजाही, मिलिंग और प्रसंस्करण का प्रबंधन और निपटान का तरीका

345.	केथरेन्चस रोजस (विन्का)	बोने के लिए बीज	(i) आस्ट्रेलिया  (ii) ग्वाटेमाला	शून्य <sup>1</sup>  शून्य	संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्त  संगरोध खरपतवार बीजों एवं मृदा से मुक्त
355.	साइनोड्जन डेक्टाइलन (लान घास)	बोने के लिए बीज	(i) यू.के. (ii) आस्ट्रेलिया	शून्य	संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्त
	साइनोड्जन डेक्टाइलन (बरमूडा घास)	प्रवर्धन के लिए घास	यू.एस.ए.	निम्नलिखित से मुक्ति: (क) चाइटोक्नेमा प्यूलीकेरिया (कर्ने फली बीटल) (ख) बेलोनोलेसस लॉगीकोडेट्स (स्ट्रिंग नेमाटोड) (ग) टाइलेकोरिन्चिस एक्यूटस (स्टाइलैट-स्टंट नेमाटोड) (घ) क्लेवीबेस्टर एक्साइली उप-प्रजाति साइनोडोन्टिस (बरमूडा घास स्टंटिंग रोग)	(i) संगरोध खरपतवार बीजों/पौधों एवं मृदा से मुक्ति (ii) 9 महीने की अवधि के लिए उगाने हेतु प्रवेश पश्चात संगरोध
383..	ओलिया यूरोपिया (ओलिव)	(i) उपयोग के लिए सूखे पत्ते	मोरक्को	निम्नलिखित से मुक्ति: (क) एस्पीडिओटस नेरी (ओक्यूवा रफेल) (ख) एपीडिस्पिस लेपेरी (यूरोपियन पीयर रफेल) (ग) सेंट्रनिया प्यारी (गेन्ट एम्परर मॉथ) (घ) ज्यूजेरा पायरिना (लियोपार्ड मॉथ)	एन.ए.पी. पर 21 डिग्री सेंटीग्रेट या उच्च तापमान पर 2 घंटे के लिए 32 ग्राम प्रति घनमीटर मिथाइल ब्रोमाइड या इसके समतुल्य या भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण सलाहकार द्वारा विद्युत रूप से अनुमेदित कोई अन्य उपचार। उक्त उपचार उद्गम देश/पुनः निर्यातक देश से जारी पादप स्वच्छता प्रमाण-पत्र में पृष्ठांकित किया जाना है।
		प्रवर्धन के लिए वनस्पति	स्पेन	निम्नलिखित से मुक्ति: (क) एकोन्टिया एट्रोकॉस (डेथ हैड हॉक मॉथ) (ख) एटेमोनेक्स (ब्लैक बोरर) (ग) एपीडिस्पिस लेपेरी (यूरोपियन पीयर रफेल) (घ) युजोफेरा पींज्यूयीस (ओलाइव मॉथ) (ङ.) हॉलेसीनस बेरीयस (बार्क बीटल) (च) लेसी ऑप्ट्रारा बेरलेसीयाना (छ) ओटियोरिन्चस आर.मेडिलो(आरमेडिलो बीविल) (ज) ओटियोरिन्चस क्रिब्रिकोलिस (एपल बीविल) (झ) फिलियोट्राइबस रफारअवाइडस (ओलाइव बार्क बीटल) (ञ) प्रेस ओलिया (ओलाइव कर्नल बोरर)	60 दिन की अवधि के लिए उगाने हेतु प्रवेश पश्चात संगरोध

				(ट) सिरटरनिया पियरी (गेन्ट एम्परर मॉथ) (ठ) ज्युजेरा पायरिना (लियोपोर्ड माथ) (ड) पजिकुला अल्वा (वार्क केंटर) (ड) एस्टर येलो फाइटो प्लाज्मा ग्रुप (ग) सूडोगोनास सबरस्टोई पी.बी. सबरस्टनाई (आलिएन्डर नॉट)	
	उपभोग/प्रसंस्करण के लिए फल	स्पेन		निम्नलिखित से मुक्ति: (क) सिरटाइटिस कैपिटाटा (भूमध्य फल परजीवी) (ख) एपिडिटास्पिस लेपेरी (यूरोपियन पीयर स्फेल) (ग) लोबेशिया बोद्राना (ग्रेप बेरी मॉथ) (घ) प्रेस औलिया (जेतून गिरी छेदक) (ड) फेओक्रिमोनियम एलियोफिलम (पेट्री रेण)	(क) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सिरटाइटिस कैपिटाटा (भूमध्य फल परजीवी) के लिए नाशीजीव मुक्ति क्षेत्र स्थिति; अथवा (ख) एन ए पी पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड या उच्च तापमान पर 2 घंटे के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड या / इसके समतुल्य भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध उपचार; अथवा (ग) भूमध्य फल परजीवी के विरुद्ध प्रशीतन पार्श्वगमन के लिए 10 दिन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 11 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप; 12 दिन से ज्यादा के लिए 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न ताप पर पोत परिवहन से पूर्व उपचार उक्त उपचार उद्गमदेश/पुनः निर्यातकता देश से जारी पादप रखच्छता प्रमाण-पत्र पर पृष्ठांकित किया जाना चाहिए।
387.	पोटुलाका प्रजाति	बोने के लिए बीज	(i) आस्ट्रेलिया  (ii) यू.के.  (iii) जापान	टोबेको रैटल वायरस (स्पेयरिंग ऑफ पोटेटो) से मुक्ति  निम्नलिखित से मुक्ति: (क) ड्यूपोन्चिलिया फोर्मीलिस (दक्षिणी यूरोपियन मार्शलैंड पिरालिड) (ख) पेरीझोमा सोशिया (पीयर्ली अंडरविंग मॉथ) (ग) फाइटोनेमस पेलिडस (स्ट्रावेरी माइट)  निम्नलिखित से मुक्ति: (क) पेरीझोमा सोशिया (पीयर्ली अंडरविंग मॉथ) (ख) फाइटोनेमस पेलीडस (स्ट्रावेरी माइट)	(i) संगरोध खरपतवार बीजों एवं मृदा से मुक्त (ii) टोबेको रैटल वायरस से मुक्ति के लिए फसल जांच एवं प्रमाणीकरण  संगरोध खरपतवार बीजों एवं मृदा से मुक्त

405.	बोना प्रजाति	बोने के लिए बीज	(i) आरट्रैलिया (ii) ग्वाटेमाला	शून्य शून्य	संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्त संगरोध खरपतवार बीजों एवं मृदा से मुक्त
406.	बायला प्रजाति (भेसी)	बोने के लिए बीज	(i) आरट्रैलिया  (ii) ग्वाटेमाला	निम्नलिखित से मुक्ति: (क) सूडामोनास विडीफ्लावा (बैकटीरियल लीफ ब्लाइट औंक टोमेटो) (ख) टोबेको रेटल वायरस  निम्नलिखित से मुक्ति: (क) गेरीडोमा सौशिया (पीयर्ली अंडर विंग मॉथ) (ख) स्पोडोप्ला फूलीपर्फा (फाल आर्मीचार्म)	(i) संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्ति (ii) टोबेको रेटल वायरस से मुक्ति के लिए फसल जांच एवं प्रमाणीकरण  संगरोध खरपतवार बीजों एवं मृदा से मुक्त
418.	हाइलोसेरियस अन्केटस (ड्रेगन फ्रूट)	उपभोग के लिए ताजे फल	(i) श्रीलंका (ii) थाइलैंड	शून्य	मृदा से मुक्ति
	हाइलोसेरियस पोलीराइज़स (ड्रेगन फ्रूट प्लांट)	प्रबर्धन के लिए तने/कलमें/पौधे	सूतेशिया	शून्य	(i) मृदा से मुक्ति (ii) 6 से 9 महीने की अवधि के लिए प्रवेश पश्चात् संगरोध
419.	इम्पेन्नेस प्रजाति (इम्पेटीन्स)	(i) प्रबर्धन के लिए पौधे	(i) यू.एस.ए.	निम्नलिखित से मुक्ति: (क) फ्रेन्कलीनीला ओसीडेन्टलिस (पश्चिमी प्लावर शिप्स) (ख) हार्सिनोथ्रिप्स फैलोरेलिस (बैंडिंड ग्रीनहाउस शिप्स) (ग) ओटिओरिन्यास सल्फेट्स (वाइन वीविल) (घ) फाइटोनेमस पेलिडस (स्ट्रावेरी माइट) (ङ.) राइजोवियम राइजोजीन्स (घ) क्लोवर येलो वीयन वायरस (सी.वाई.वी.वी.) (छ) इम्पेटीन्स नेक्रोटिक स्पाट वायरस (टी.एस.डब्ल्यू.वी. - । )	(i) मृदा से मुक्ति (ii) 45 दिन की अवधि के लिए प्रवेश पश्चात् संगरोध
		(ii) नीदरलैंड		निम्नलिखित से मुक्ति: (क) फ्रेन्कलीनीला ओसीडेन्टलिस (पश्चिमी प्लावर शिप्स) (ख) ओटिओरिन्यास सल्फेट्स (वाइन वीविल) (ग) फाइटोनेमस पेलिडस (स्ट्रावेरी माइट) (घ) क्लोवर येलो वीयन वायरस (सी.वाई.वी.वी.) (छ) इम्पेटीन्स नेक्रोटिक स्पाट वायरस (टी.एस.डब्ल्यू.वी. - । )	(i) मृदा से मुक्ति (ii) 45 दिन की अवधि के लिए प्रवेश पश्चात् संगरोध
		(ii) ऊतक संवर्धक वनस्पति	(i) यू.एस.ए. (ii) नीदरलैंड	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धक पौधों को मात्र रक्तांश से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया और उसे क्लोवर येलो वीयन वायरस और इम्पेटीन्स नेक्रोटिक स्पाट वायरस से मुक्त रखा गया	शून्य

	इम्पेन्टेन्स प्रजाति	बोने के लिए बीज	ग्राटेमाला	शून्य	संगरोध स्वरपतवार बीजों एवं मृदा से मुक्ति
484.	मैटीफेस इंडिका (आम)	प्रबधन के लिए क्रतरने/कलर्ने/ और जड़ वाले पौधे	(i) ब्राजील  (ii) क्यूबा  (iii) नाइजर  (iv) नाइजीरिया	निम्नलिखित से मुक्ति: (क) एटेलोनेकस (ब्लैक बोरर) (ख) एस्ट्रीडिलीटस नेरी (ओम्बुदा रक्केल) (ग) एस्ट्रोलोरेसिनियन वसटेलेस्ट्रा (घ) अटटा प्रजाति (पते काटने वाले चीटियाँ) (ङ.) क्राकमेटोबरस्टर फ्लैवीस्ट्रीनोरा (च) अस्थस्टस हेंडर (छ) हांरिओला शिम्टा (दाल) गोड़हापर (ज) हाइपोथेनेमरा एर्प्पिडिट्रा (झ) सूडोकोकस ऐक्विरीय हररा (जैक बीयर्डली मीलीबग) (अ) रिन्वोफ्रोरस पेल्मेरम (ट) सेलनेसिडस आर्टिकुलेट्स (ठ) सेलनेसिडस आर्टिकुलेट्स (ड.) राइजोवियम राइजोजीन्स  निम्नलिखित से मुक्ति: (क) एटेमोनेकस (ब्लैक बोरर) (ख) एस्ट्रोलोरेसिनियन वसटेलेस्ट्रा (ग) अटटा प्रजाति (पते काटने वाले चीटियाँ) (घ) डायाप्रेपस स्पलोंगलेरी (ङ.) इस्कनेसियस लॉगीराइट्स (च) मायसिटेस्टियस पसोनाना (छ) पेन्केनियस लिट्स (ज) पैराकोकस मर्जिनेट्स (झ) प्रोटोपलविनारिया मैंगीफेरा (अ) सूडोकोकस जैकवीर्डली (ट) रिन्वोफ्रोरस पेल्मेरम (ठ) सेलनेसिडस आर्टिकुलेट्स (ड.) विन्सोनिया स्टेलीफरा (रटेलेट रक्केल) (जै) ओलिगोनाइचस योथेसी (एवोकेडो माइट) (ण) सेकॉस्पोरा मैंगीफेरा (लीफ स्पाट)  निम्नलिखित से मुक्ति: (क) एटेसोनेकस (ब्लैक बोरर) (ख) क्रिटोकल्लेबिया ल्यूकटोरेटा (ग) होप्लोलेमस पैरारोबरस्टस (लैंस नेमाटोड)  निम्नलिखित से मुक्ति: (क) एनोस्पोक्नेमिस कर्दाइप्पा (ख) एटेमोनेकस (ब्लैक बोरर) (ग) एस्ट्रीडिओटस नेरी (ओम्बुदा रक्केल) (घ) बथाइकोलिया थेलेसिना (ङ.) क्रिटोफल्लेबिया ल्यूकटोरेटा	(i) मृदा से मुक्त (ii) कृषि एवं सहकारिता विभाग पूर्वानुमति शर्त पर वाणिज्यक आयात (iii) ६-९ माह की अवधि के लिए उगाने हेतु प्रयेश पश्चात संगरोध  (i) मृदा से मुक्त (ii) कृषि एवं सहकारिता विभाग पूर्वानुमति शर्त पर वाणिज्यक आयात (iii) ६-९ माह की अवधि के लिए उगाने हेतु प्रयेश पश्चात संगरोध  (i) मृदा से मुक्त (ii) कृषि एवं सहकारिता विभाग पूर्वानुमति शर्त पर वाणिज्यक आयात (iii) ६-९ माह की अवधि के लिए उगाने हेतु प्रयेश पश्चात संगरोध  (i) मृदा से मुक्त (ii) कृषि एवं सहकारिता विभाग पूर्वानुमति शर्त पर वाणिज्यक आयात (iii) ६-९ माह की

				(च) हेलोपर्टिस शूटेडी (छ) पच्चोडा इन्फ्राटा (चैफर बीटल) (ज) प्लैनोकोकोडिस जैलेसिस (झ) सिर्टोंथ्रिप्स ओरेन्टी (सिद्रस थ्रिप्स) (ज) सेलनेस्पिडस आर्टिकुलेट्स (झ) होप्लोलेमस पेराशोबस्टस (लैंस नेमाटोड)	अवधि के लिए उगाने हेतु प्रवेश पश्चात् संगरोध
			(i) थाइलैंड	निम्नलिखित से मुक्ति: (क) बेक्ट्रोसेरा परीता (परीता फल परजीवी) (ख) कोट्टोटर्मिस कर्विंगनेथस (रबर दीमक)	(i) अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बेक्ट्रोसेरा परीते (परीता फल परजीवी) के लिए नाशीजीव मुक्ति क्षेत्र स्थिति या एन ए पी के तहत 21 डिग्री सेंटीग्रेड या उच्च तापमान पर 32 ग्राम प्रति घन मीटर पर नियाइल ब्रोमाइड या इसके समतुल्य पदार्थ के साथ बेक्ट्रोसेरा परीते (परीता फल परजीवी) के विरुद्ध प्रधूमीकरण। उक्त उपचार उदगम/पुनः निर्यातक देश से जारी पादप स्वच्छता प्रमाण-पत्र पृष्ठांकित किया जाएगा। (ii) मृदा से मुक्ति (iii) कृषि एवं सहकारिता विभाग की पुर्वानुमति की शर्त पर वाणिज्यिक आयात। (iv) 6-9 महीने की अवधि के लिए प्रवेश पश्चात् संगरोध।
575.	जिप्सोफिला पेनीकुलेटा	(i) ऊतक संवर्धक वनस्पति	इजराइल	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धक पौधों को मातृ स्फन्द्य से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया और उसे वायरस से मुक्त रखा गया।	(i) 45 दिन की अवधि के लिए प्रवेश पश्चात् संगरोध
		(ii) प्रवर्धन के लिए तने/कलमे/पौधे	इजराइल	राईसिक बुहरी से मुक्त	(i) 90 दिन की अवधि के लिए प्रवेश पश्चात् संगरोध (ii) मृदा से मुक्ति
	जिप्सोफिला प्रजाति	(iii) बोने के लिए बीज	डेनमार्क	शून्य	संगरोध खरपतवार जीजों एवं मृदा से मुक्त

(ii) क्रम संख्या 579 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्याएं एवं प्रविष्टियां अन्तर्थापित की जाएगी, अर्थात् -

क्र. सं.	वनस्पति प्रजाति	वनस्पति सामग्री की श्रेणी	उद्गम देश	पादप स्वच्छता प्रमाण-पत्र में सम्मिलित की जानेवाली अपेक्षित अतिरिक्त घोषणाएं (5)	आयात के लिए विशेष शर्तें (6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
580.	चाटा एड्यूलिस (मीरा फसे)	उपयोग के लिए पत्ते	इथोपिया	शून्य	मृदा से मुक्ति
581.	एमॉफिला मिथेली	छाल सहित और छाल रहित लकड़ी	आस्ट्रेलिया	निम्नलिखित से मुक्तः बेमिसिया टोबेकी (शी-वायोटाइप) (सिल्वर लीफ वाइटफ्लाई)	(i) मृदा से मुक्ति (ii) एन.ए.पी. पर 21 डिग्री सेंटीग्रेट या उच्च तापमान पर 48 ग्राम प्रति घनमीटर मिथाइल ब्रोमाइड या इसके समतुल्य पदार्थ के साथ प्रदूषीकरण या भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण सलाहकार द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित कोई अन्य उपचार उक्त उपचार उद्गम देश/पुनःनियांतक देश से जारी पादप स्वच्छता प्रमाण-पत्र में पृष्ठांकित किया जाएगा।
582.	एनोजीसस लियोकार्पस	ओषधीय/प्रसंसकरण के लिए सूखी वनस्पति सामग्री	कोस्टारिका, सेनेगल, बर्किना फ़ेसो	शून्य	संगरोध खरपतवार बीजों एवं मृदा से मुक्ति
583.	डिजिटेलिस प्रजाति	बोने के लिए बीज	ग्राटेमाला	शून्य	संगरोध खरपतवार बीजों एवं मृदा से मुक्ति
584.	हाइपोस्टिस प्रजाति	बोने के लिए बीज	नीदरलैंड, डेनमार्क एवं जर्मनी	शून्य	संगरोध खरपतवार बीजों एवं मृदा से मुक्ति
585.	टिलेडेसिया प्रजाति (सभी संबंधित प्रजातियां) (वायु से उत्पन्न पौधे)	प्रवर्धन के लिए पौधे	यू.एस.ए.	निम्नलिखित से मुक्तः (क) निपेकोक्स निपे (स्पाइकड भीलीवांग) (ख) यूनेस्स सिट्री (सिट्रस न्नो रूकेल)	(i) 60 दिन की अवधि के लिए प्रवेश पश्चात् संगरोध (ii) मृदा से मुक्ति
586.	स्टर्लिंगा लेटीफोलिया प्रजाति	सजावट के लिए सूखे फूल	आस्ट्रेलिया	निम्नलिखित से मुक्तः पीनियस मिनि (पाइन बूली एफिड)	संगरोध खरपतवार बीजों एवं मृदा से मुक्ति
587.	मोमोइन्चूला पेनीकुलेटा	सजावट के लिए सूखे फूल	आइलैंड	शून्य	संगरोध खरपतवार बीजों एवं मृदा से मुक्ति
588.	टिथोनिया	सजावट के लिए सूखे फूल	आस्ट्रेलिया	शून्य	संगरोध खरपतवार बीजों एवं मृदा से मुक्ति
589.	ए. डेंजी आइक्सोडिया एथिलिओडिस	सजावट के लिए सूखे फूल	आस्ट्रेलिया	शून्य	संगरोध खरपतवार बीजों एवं मृदा से मुक्ति
590.	लोभेड्रा प्रजाति	ऊतक संवर्धक पौधे	आस्ट्रेलिया	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धक पौधों को मातृ रक्तधू से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और इन्हें वायरस से मुक्त रखा गया था।	शून्य
591.	डायनेला प्रजाति (नेटिव फ्लैवर्स)	ऊतक संवर्धक पौधे	आस्ट्रेलिया	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धक पौधों को मातृ रक्तधू से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और	शून्य

				इन्हे वायरस से मुक्त रखा गया था।	
592.	धूत्रा अद्वा	सूखी वनस्पति सामग्री (औषधीय प्रयोग के लिए) पौधे के सभी भाग	चीन	शून्य	संगरोध खरपतवार बीजों एवं मृदा से मुक्त
593.	एकोनटम नेपेलस	सूखी वनस्पति सामग्री (औषधीय प्रयोग के लिए (पौधे के सभी भाग)	चीन	शून्य	संगरोध खरपतवार बीजों एवं मृदा से मुक्त
594.	सेलिया हिस्कोनिका	बोने के लिए बीज	आस्ट्रेलिया	शून्य	संगरोध खरपतवार बीजों एवं मृदा से मुक्त
595.	सेलिया प्रजाति	बोने के लिए बीज	ग्वाटेमाला	निम्नलिखित से मुक्तः- (क) लाइगस लाइनोलेरिस (टार्निशड प्लांट बग) (ख) पेरीझ्मा सोशिया (पीयरी अंडरविंग मॉथ) (ग) सूडोकोकस जैकबर्डस्ली (जैकबर्डस्ली मीलीबग)	संगरोध खरपतवार बीजों एवं मृदा से मुक्त
596.	एस्प्रेगस रेस्पोसर्स (सतावरी पिति)	औषधीय प्रयोग के लिए जड़ें	चीन	शून्य	संगरोध खरपतवार बीजों एवं मृदा से मुक्त
597.	एचिली मिलेफोलियम	सजावट के लिए सूखे फूल	थाइलैंड	शून्य	संगरोध खरपतवार बीजों एवं मृदा से मुक्त

[फा. सं. 8-20/2005-पी.पी.-1]

पंकज कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—बनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 दिनांक 18-11-2003 का संख्या का.आ. 1322(अ) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया और इसके पश्चात् दिनांक 6-2-2004 सं. का.आ. 167(अ), दिनांक 29-3-2004 सं. का.आ. 427(अ), दिनांक 31-5-2004 सं. का.आ. 644(अ), दिनांक 25-2-2005 सं. का.आ. 263(अ), दिनांक 31-3-2005 सं. का.आ. 462(अ), दिनांक 14-7-2006 सं. का.आ. 1121(अ), दिनांक 31-7-2006 सं. का.आ. 1363(अ), दिनांक 31-10-2006 सं. का.आ. 1873(अ), दिनांक 6-12-2006 सं. का.आ. 2074(अ), दिनांक 3-12-2007 सं. का.आ. 2888(अ), दिनांक 31-12-2007 सं. का.आ. 3(अ), दिनांक 8-12-2008 सं. का.आ. 2847(अ), 15-12-2008 सं. का.आ. 2888(अ) द्वारा संशोधित किए गये।

**MINISTRY OF AGRICULTURE**  
**(Department of Agriculture and Cooperation)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2009

S.O. 2286(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, namely:-

1. (1) This Order may be called the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (First Amendment), Order, 2009.  
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
  
2. In the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 (herein referred to as the said Order) in Schedule VI:-
  - (i) for serial numbers 30, 44, 49, 83, 141, 152, 154, 155, 159, 180, 223, 262, 266, 319, 345, 355, 383, 387, 405, 406, 418, 419, 484, 575 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

S.No:	Plant species	Category of plant material	Country of origin	Additional declarations required to be incorporated into Phytosanitary Certificate	Special conditions of import
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“30	<i>Antirrhinum majus</i> (Antirrhinum)	Seeds for sowing	(i) Australia	Free from: (a) <i>Colletotrichum antirrhini</i> (Anthracnose) (b) <i>Puccinia antirrhini</i> (Rust)	Free from quarantine weed seeds.
			(ii) Europe (except UK)	Free from <i>Colletotrichum antirrhini</i> (Anthracnose)	Free from quarantine weed seeds.
			(iii) Guatemala	NIL	Free from quarantine weed seeds.
			(iv) U.K.	Free from: (a) <i>Heteropatella antirrhini</i> (Leaf spot)	Free from quarantine weed seeds.

				(b) <i>Phyllosticta antirrhini</i> (Stem root) (c) <i>Pseudomonas ananas</i> (Bacterial leaf spot).	
			(y) USA	Free from : (a) <i>Colletotrichum antirrhini</i> (Anthracnose) (b) <i>Heteropatella antirrhini</i> (Leaf spot) (c) <i>Phyllosticta antirrhini</i> (Stem root) (d) <i>Puccinia antirrhini</i> (Rust)	Free from quarantine weed seeds.
	<i>Antirrhinum spp.</i>	Seeds sowing for	(i) Japan	NIL	Free from quarantine weeds seeds and soil.
44.	<i>Begonia spp.</i>	Seeds sowing for	(i) Europe (ii) Japan (iii) North America	Free from <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Brown ring disease of hyacinth)	Free from quarantine weed seeds.
			(iv) Guatemala	Free from <i>Pseudococcus jackbeardsleyi</i> (Jack Beardsley mealybug)	Free from quarantine weeds seeds and soil.
			(v) UK (vi) Italy (vii) Germany	Free from: (a) <i>Arabis mosaic virus</i> (b) <i>Strawberry latent ringspot virus</i> (c) <i>Asparagus virus 1</i> (d) <i>Asparagus virus 2</i>	(i) Free from quarantine weeds seeds (ii) Free from soil contamination (iii) Seed crop Inspection and certification for free from (a), (b), (c) and (d) by a competent authority at the country of origin.
			(viii) Spain	Free from: (a) <i>Strawberry latent ringspot virus</i> (b) <i>Acremonium strictum</i>	(i) Free from quarantine weeds seeds (ii) Free from soil contamination (iii) Seed crop inspection and certification of

					free from (a) by a competent authority at the country of origin.
49.	<i>Betula</i> spp. (Birch)	Wood with/without bark	(i) Europe (ii) North America	Free from <i>Agrius anxius</i> (Bronze-birch borer)	Fumigation with Methyl bromide at 48 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent thereof or any other treatment approved by Plant Protection Adviser. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.
	<i>Betula platyphylla</i> (Brich wood dowels)	Wood without bark	(iii) China	Free from : - (a) <i>Anoplophora chinensis</i> (Black and white citrus longhorn) (b) <i>Monochamus sutor</i> (Brown crumbly rot)	Fumigation with Methyl bromide at 48 g. per cubic meter for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent there of or any other treatment duly approved by the Plant Protection Adviser to the Govt. of India. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the Country of Origin/re-export
83.	Citrus spp. (Orange)	Fresh fruits for consumption	(i) Australia	Free from: (a) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) (b) <i>Bactrocera aquilonis</i> (c) <i>Bactrocera jarvisi</i> (d) <i>Bactrocera neohumeralis</i> (e) <i>Bactrocera tryoni</i>	(a) Pest-free area status for <i>Bactrocera aquilonis</i> , B. <i>jarvisi</i> , B. <i>neohumeralis</i> , B. <i>tryoni</i> (Queensland fruit fly) and <i>Ceratitis</i>

			<p>(Queensland fruit fly)</p> <p>(f) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly)</p> <p>(g) <i>Epiphyas postvittana</i> (light brown apple moth)</p> <p>(h) <i>Guignardia citricarpa</i> (citrus black spot)</p> <p>(i) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealybug)</p> <p>(j) <i>Unaspis citri</i> (citrus snow scale)</p>	<p><i>capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards</p> <p>Or</p> <p>(b) Methyl bromide fumigation @ 32g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly and Queensland fruit fly</p> <p>Or</p> <p>(c) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly and 0°C or below for 13 days; 0.55°C or below for 14 days; 1.1°C or below for 18 days plus in-transit refrigeration against Queensland fruit fly.</p>
		(ii) Canada	<p>Free from:</p> <p>(a) <i>Metcalfa pruinosa</i> (frosted moth bug)</p> <p>(b) <i>Pseudococcus comstocki</i> (Comstock mealybug)</p> <p>(c) <i>Pseudococcus jackbeardsleyi</i></p>	NIL

			(Jack Beardsley mealybug)	
		(iii) Chile	<p>Free from:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale)</li> <li>(b) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly)</li> <li>(c) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealybug)</li> <li>(d) <i>Selenaspis articulatus</i> (West Indian red scale)</li> <li>(e) <i>Unaspis citri</i> (citrus snow scale)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pest free area status for <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or</li> <li>(b) Methyl bromide fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs. at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly</li> <li>or</li> <li>(c) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly.</li> </ul>
		(iv) China	<p>Free from:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale)</li> <li>(b) <i>Bactrocera tsuneonis</i> (Japanese orange fly)</li> <li>(c) <i>Ceroplastes japonicus</i> (tortoise wax scale)</li> <li>(d) <i>Guignardia citricarpa</i> (citrus black spot)</li> <li>(e) <i>Oraesia excavata</i> (fruit piercing moth)</li> <li>(f) <i>Pseudococcus</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pest free area status for <i>Bactrocera tsuneonis</i> (Japanese orange fly) as per international standards or</li> <li>(b) Methyl bromide fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs. at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against</li> </ul>

			<p><i>calceolariae</i> (scarlet mealybug)</p> <p>(g) <i>Pseudococcus comstocki</i> (Comstock mealybug)</p> <p>(h) <i>Pseudococcus jackbeardsleyi</i> (Jack Beardsley mealybug)</p> <p>(i) <i>Unaspis citri</i> (Citrus snow scale)</p> <p>(j) <i>Unaspis yanonensis</i> (arrowhead scale)</p>	Mediterranean fruit fly or (c) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly.
		(v) France	Free from: (p) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) (q) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (r) <i>Ceroplastes japonicus</i> (tortoise wax scale) (s) <i>Metcalfa pruinosa</i> (frosted moth) (t) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealybug) (u) <i>Unaspis yanonensis</i> (arrowhead scale)	(a) Pest free area status for <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) Methyl bromide fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs. at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly or (c) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly.
		(vi) Iran	Free from <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale)	NIL

		(vii) Italy	Free from: (a) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) (b) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (c) <i>Ceroplastes            japonicus</i> (tortoise wax scale) (d) <i>Metcalfa pruinosa</i> (frosted moth bug) (e) <i>Pseudococcus            calceolariae</i> (scarlet mealybug)	(a) Pest free area status for <i>Ceratitis            capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) Methyl bromide fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs. at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly or (c) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly.
		(viii) New Zealand	Free from: (a) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) (b) <i>Epiphyas            postvittana</i> (light brown apple moth) (c) <i>Guignardia            citricarpa</i> (citrus black spot) (d) <i>Panonychus citri</i> (citrus red mite) (e) <i>Pseudococcus            calceolariae</i> (scarlet mealybug) (f) <i>Unaspis citri</i> (citrus snow scale)	Methyl bromide fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs. at 21°C or above at NAP or equivalent thereof
		(ix) South Africa	Free from: (a) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale)	(a) Pest free area status for <i>Ceratitis</i>

			(b) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (c) <i>Ceratitis rosa</i> (Natal fruitfly) (d) <i>Cryptophlebia leucotreta</i> (false codling moth) (e) <i>Guignardia citricarpa</i> (citrus black spot) (f) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealybug)	<i>capitata</i> (Mediterranean fruit fly) and <i>Ceratitis rosa</i> (Natal fruit fly) as per international standards or (b) Methyl bromide fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly and Natal fruit Fly or (c) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly and Natal fruit fly
		(x) USA	Free from: (a) <i>Anastrepha fraterculus</i> (South American fruitfly) (b) <i>Anastrepha ludens</i> (Mexican fruit fly) (c) <i>Anastrepha serpentina</i> (sapodilla fruit fly) (d) <i>Anastrepha striata</i> (guava fruit fly) (e) <i>Anastrepha suspense</i> (caribbean fruit fly) (f) <i>Aspidiotus nerii</i>	(a) Pest free area status for <i>Anastrepha fraterculus</i> (South American fruit fly), <i>A.ludens</i> (Mexican fruit fly), <i>A.serpentina</i> (Sapodilla fruit fly), <i>A.striata</i> (Guava fruit fly), <i>A.suspense</i> (Caribbean fruit fly) and <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean

				<p>(aucuba scale)</p> <p>(g) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly)</p> <p>(h) <i>Epiphyas postvittana</i> (light brown apple moth)</p> <p>(i) <i>Metcalfa pruinosa</i> (frosted moth bug)</p> <p>(j) <i>Panonychus citri</i> (citrus red mite)</p> <p>(k) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealybug)</p> <p>(l) <i>Pseudococcus comstocki</i> (Comstock mealybug)</p> <p>(m) <i>Pseudococcus jackbeardsleyi</i> (Jack Beardsley mealybug)</p> <p>(n) <i>Selenaspis articulatus</i> (West Indian red scale)</p> <p>(o) <i>Unaspis citri</i> (citrus snow scale)</p>	<p>fruit fly) as per international standards or</p> <p>(b) Methyl bromide fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly or MB fumigation @ 40 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against <i>Anastrepha</i> spp. or</p> <p>(c) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; at 0.55°C or below for 11 days; at 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly and 0.55°C or below for 18 days; at 1.1°C or below for 20 days; plus in-transit refrigeration against <i>Anastrepha</i> spp.</p>
			(xi) Egypt	<p>Free from :-</p> <p>(a) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly)</p> <p>(b) <i>Brevipalpus lewisi</i> (citrus flat mite)</p> <p>(c) <i>Spiroplasma citri</i> (stubborn disease)</p>	<p>(a) Pest free status for <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or</p>

				of citrus)	(b) Methyl bromide fumigation @ 32g/cubic metre for 2 hrs at 21 deg. C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly. or (c) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly and 0°C or below for 13 days; 0.55°C or below for 14 days; 1.1°C or below for 18 days. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the Country of Origin/re-export.
(xii) Morocco	Free from :- (a) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (b) <i>Pantomorus cervinus</i> (Fuller's rose beetle) (c) <i>Peridroma saucia</i> (pearly underwing moth) (d) <i>Spiroplasma citri</i> (stubborn disease	(a) Pest free status for <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) Methyl bromide fumigation @ 32g/cubic metre			

				of citrus)	for 2 hrs at 21° C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly: or (c) Pre-shipment cold treatment at 0° C or below for 10 days; 0.55° C or below for 11 days; 1.1° C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly and 0° C or below for 13 days; 0.55° C or below for 14 days; 1.1° C or below for 18 days. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the Country of Origin/re-export.
	<i>Citrus maxima</i> (Pomelo), <i>Citrus sinensis</i> , <i>Citrus reticulata</i> , <i>Citrus paradise</i> , <i>Citrus nobilis</i> , <i>Citrus deliciosa</i> spp.	Plants for propagation	Thailand	Nil	(i) Post-entry quarantine growing for a period of 10-12 months (ii) Free from soil (iii) Commercial import subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation

141.	<i>Eustoma Spp.</i>	Seeds for sowing	(i) Europe (ii) Japan (iii) Taiwan (iv) USA (v) Guatemala	NIL	Free from quarantine weed seeds and soil.
152.	<i>Gazania spp.</i>	Seeds for sowing	(i) Europe (ii) USA (iii) Japan	NIL	Free from quarantine weed seeds and soil.
			(iv) Guatemala	NIL	Free from quarantine weed seeds and soil.
154.	<i>Gentiana spp.</i> (Chireta)	Tissue cultured plants	(i) Japan	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) Bean yellow mosaic virus (b) Broad bean wilt virus (c) Clover yellow vein virus (d) Tobacco rattle virus	NIL
			(ii) USA	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) Bean yellow mosaic virus (b) Impatiens necrotic spot virus	NIL
			(iii) Germany	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from gentiana carlavirus.	NIL
			(iv) Australia	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from broad bean wilt virus.	NIL

			(v) UK	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from tomato black ring virus	NIL
			(vi) Any country except Japan, Germany, Australia, UK, USA	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus.	NIL
		(ii) Dry plant material (All plant parts) for medicinal purpose	China	Free from <i>Cronartium flaccidum</i> (scots pine blister rust)	Free from Quarantine weed seeds and soil.
155.	<i>Geranium spp.</i>	(i) Seeds for sowing	(i) USA (ii) Asia (iii) Europe	NIL	Free from quarantine weed seeds
			(iv) Guatemala	Free from :- (a) <i>Phenacoccus madeirensis</i> (cassava mealybug) (b) <i>Pseudococcus jackbeardsleyi</i> (Jack Beardsley mealybug) (c) <i>Spodoptera frugiperda</i> (fall armyworm)	Free from quarantine weed seeds and soil.
		(ii) Tissue cultured plants	(i) USA	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) Tomato spotted wilt virus (b) Pelargonium line pattern carmovirus (c) Pelargonium ring spot virus (d) Pelargonium vein clearing virus (e) Potato virus S (f) Impatiens necrotic	NIL

			spot virus	
(ii) Netherlands	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) Pelargonium leaf curl virus (b) Pelargonium vein netting virus (c) Arabis mosaic virus (d) Tomato ring spot virus (e) Tomato black ring virus (f) Tobacco necrosis virus	NIL		
(iii) Canada	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) Tomato spotted wilt virus (b) Impatiens necrotic spot virus	NIL		
(iv) Italy	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) Pelargonium ring spot virus (b) Pelargonium chlorotic ring pattern virus (c) Pelargonium zonate spot virus	NIL		
(v) Iran (vi) France	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from tomato spotted wilt virus.	NIL		

		(vii) UK	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from pelargonium line pattern carmovirus	NIL
		(viii) Hungary (ix) Germany	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from pelargonium flower – break virus	NIL
		(x) Czech Republic	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from pelargonium leaf curl virus	NIL
		(xi) Sweden	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from tomato ring spot virus.	NIL
		(xii) Poland	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from tobacco necrosis virus	NIL
		(xiii) Any country except USA, UK, Italy, Hungary, Germany, Netherlands, Czech Republic, Sweden, Poland, Canada	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus.	NIL

159.	<i>Gomphrena spp.</i> ( <i>Globasa</i> )	Seeds for sowing	(i) Germany (ii) Taiwan (iii) USA (iv) Netherlands (v) France	NIL	Free from quarantine weed seeds.
	<i>Gomphrena spp.</i>	Seeds for sowing	(i) Japan	Free from Soybean dwarf virus	Free from quarantine weed seeds and soil.
180.	<i>Ipomoea spp.</i> ( <i>Kangkong</i> )	(i) Seeds for sowing	(i) Netherlands (ii) France (iii) Germany (iv) Taiwan (v) Japan (vi) UK (vii) Thailand	NIL	Free from quarantine weed seeds and soil.
		(ii) Rhizomes for propagation	(i) Germany (ii) Netherlands (iii) France	Free from: (a) <i>Ditylenchus destructor</i> (potato tuber nematode) (b) <i>Ditylenchus dipsaci</i> (brown ring disease of hyacinth)	(i) Free from soil. (ii) Post-entry quarantine for one growth season.
223.	<i>Myosotis spp.</i>	Seeds for sowing	(i) USA	NIL	Free from quarantine weed seeds
			(ii) Netherlands	Free from <i>Phytonemus pallidus</i> (Strawberry mite)	Free from quarantine weed seeds.
262	Pome fruits: (Apple, Pear. ( <i>Pyrus spp.</i> ) and Quince ( <i>Cydonia spp.</i> )	(i) Cuttings/ Saplings/ Bud wood for planting or propagation	Any Country	Free from: (a) Fire blight <i>(Erwinia amylovora)</i> (b) Crown gall <i>(Agrobacterium tumefaciens)</i> (c) Hairy root ( <i>A. rhizogenes</i> ) (d) Apple and pear rusts <i>(Gymnosporangium spp.)</i> non asiatic (e) Apple scar skin, apple stem grooving viruses. (f) Seed chalcid <i>(Megastigmus spermotrophus)</i>	(i) Post-entry quarantine for a period of 1-2 years. (ii) Import subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation in the Ministry of Agriculture.

			(g) Viruses/ phytoplasmas affecting Pomidae.	
	(ii) Tissue cultured plants	Any Country	Certified that the planting material is obtained from mother stock indexed/tested and maintained free from viruses and phytoplasmas affecting Pomidae.	The above condition at (i) shall not apply.
	(iii) Fresh fruits for consumption	(i) Australia	<p>Free from:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) <i>Bactrocera tryoni</i> (Queensland fruit fly)</li> <li>(b) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly)</li> <li>(c) <i>Cydia pomonella</i> (codling moth)</li> <li>(d) <i>Epiphyas postvittana</i> (light brown apple moth)</li> <li>(e) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealybug)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pest free status for <i>Bactrocera tryoni</i> (Queensland fruit fly) and <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or</li> <li>(b) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly and 0°C or below for 13 days; 0.55°C or below for 14 days; 1.1°C or below for 18 days plus in-transit refrigeration against Queensland fruit fly</li> </ul>
		(ii) Canada	<p>Free from :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) <i>Cydia molesta</i> (oriental fruit moth)</li> <li>(b) <i>Erwinia amylovora</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pest free area status for <i>Rhagoletis pomonella</i> (Apple maggot) as per international</li> </ul>

				(fireblight) (c) <i>Pandemis heparana</i> (apple brown tortrix) (d) <i>Peridroma saucia</i> (pearly under wing moth) (e) <i>Pseudococcus comstocki</i> (Comstock mealy bug) (f) <i>Rhagoletis pomonella</i> (apple maggot)	standards or (b) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against <i>Rhagoletis pomonella</i> (Apple maggot)
			(iii) Chile	Free from <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly)	(a) Pest free status for <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly
			(iv) China	Free from : (a) <i>Adoxophyes orana</i> (summer fruit tortrix) (b) <i>Cydia funebrana</i> (red plum maggot) (c) <i>Cydia inopinata</i> (Manchurian fruitmoth) (d) <i>Cydia molesta</i> (Oriental fruit moth) (e) <i>Cydia pomonella</i> (Codling moth) (f) <i>Pandemis</i>	(a) Pest free status for <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days

				<i>cerasana</i> (Common twist moth) (g) <i>Pandemis</i> <i>heparana</i> (apple brown tortrix) (h) <i>Peridroma saucia</i> (Pearly underwing moth)	plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly
			(v) France	Free from : (a) <i>Adoxophyes orana</i> (summer fruit tortrix) (b) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (c) <i>Cydia funebrana</i> (red plum maggot) (d) <i>Cydia molesta</i> (oriental fruit moth) (e) <i>Cydia pomonella</i> (codling moth) (f) <i>Erwinia amylovora</i> (fire blight) (g) <i>Pandemis</i> <i>heparana</i> (apple brown tortrix) (h) <i>Peridroma saucia</i> (pearly underwing moth) (i) <i>Pseudococcus</i> <i>calceolariae</i> (scarlet mealybug)	(a) Pest free status for <i>Ceratitis</i> <i>capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly.
			(vi) Iran	Free from <i>Cydia</i> <i>pomonella</i> (codling moth)	NIL
		(vii) New Zealand		Free from : (a) <i>Cydia molesta</i> (oriental fruit moth) (b) <i>Cydia pomonella</i> (Codling moth) (c) <i>Epiphyas</i> <i>postvittana</i> (light brown apple moth) (d) <i>Erwinia</i> <i>amylovora</i> (fire blight)	NIL

			(e) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealy bug)	
		(viii) South Africa	Free from : <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly)</li> <li>(b) <i>Ceratitis rosa</i> (Natal fruit fly)</li> <li>(c) <i>Cydia molesta</i> (Oriental fruit moth)</li> <li>(d) <i>Cydia pomonella</i> (Codling moth)</li> <li>(e) <i>Erwinia amylovora</i> (fire blight)</li> <li>(f) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealy bug)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pest free area status for <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) and <i>Ceratitis rosa</i> (Natal fruit fly) or</li> <li>(b) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly</li> </ul>
		(ix) USA	Free from : <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly)</li> <li>(b) <i>Cydia pomonella</i> (codling moth)</li> <li>(c) <i>Epiphyas postvittana</i> (light brown apple moth)</li> <li>(d) <i>Erwinia amylovora</i> (firtblight)</li> <li>(e) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealy bug)</li> <li>(f) <i>Pseudococcus comstocki</i> (Comstock mealy bug)</li> <li>(g) <i>Rhagoletis pomonella</i> (apple maggot)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pest free status for <i>Rhagoletis pomonella</i> (Apple maggot) and <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or</li> <li>(b) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Apple maggot and Mediterranean fruit fly.</li> </ul>

			(x) Italy	Free from : (a) <i>Adoxophyes orana</i> (summer fruit tortrix) (b) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (c) <i>Cydia funebrana</i> (red plum maggot) (d) <i>Cydia molesta</i> (oriental fruit moth) (e) <i>Erwinia            amylovora</i> (fireblight) (f) <i>Pandemis            cerasana</i> (common twist moth) (g) <i>Pandemis            heparana</i> (apple brown tortrix) (h) <i>Peridroma saucia</i> (pearly underwing moth) (i) <i>Pseudococcus            calceolariae</i> (scarlet mealy bug)	(a) Pest free status for <i>Ceratitis            capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly
--	--	--	-----------	---	--

Apple ( <i>Malus domestica</i> )	Fresh fruits for consumption	(i) USA	Free from : (a) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (b) <i>Cydia pomonella</i> (codling moth) (c) <i>Epiphyas postvittana</i> (light brown apple moth) (d) <i>Erwinia amylovora</i> (fireblight) (e) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealy bug) (f) <i>Pseudococcus comstocki</i> (Comstock mealy bug) (g) <i>Rhagoletis pomonella</i> (apple maggot) (h) <i>Anastrepha fraterculus</i> (South American fruit fly) (i) <i>Anastrepha ludens</i> (Mexican fruit fly) (j) <i>Anastrepha serpentina</i> (Sapodilla fruit fly) (k) <i>Anastrepha suspense</i> (Caribbean fruit fly) (l) <i>Anthonomus quadrigibbus</i> (apple curculio) (m) <i>Epidiaspis leperii</i> (European pear scale) (n) <i>Grapholita molesta</i> (Oriental fruit fly)	(a) Pest free status for <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) Methyl bromide fumigation @ 32g/cubic metre for 2 hrs at 21° C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly. or (c) Pre-shipment cold treatment at 0° C or below for 10 days; 0.55° C or below for 11 days; 1.1° C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the Country of Origin/re-export.
----------------------------------	------------------------------	---------	--	---

		(ii) Brazil	Free from :- (a) <i>Anastrepha fraterculus</i> (South American fruit fly) (b) <i>Anastrepha M editerran</i> (sapodilla fruit fly) (c) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (d) <i>Grapholita molesta</i> (oriental fruit moth) (e) <i>Harmonia axyridis</i> (harlequin ladybird) (f) <i>Apple stem pitting virus</i> (apple Spy 227 epinasty & decline) (g) <i>Peridroma saucia</i> (pearly underwing moth)	(a) Pest free status for <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) Methyl bromide fumigation @ 32g/cubic metre for 2 hrs at 21° C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly. or (c) Pre-shipment cold treatment at 0° C or below for 10 days; 0.55° C or below for 11 days; 1.1° C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the Country of Origin/re-export.
		(iii) Poland	Free from :- (a) <i>Adoxophyes orana</i> (summer fruit tortrix) (b) <i>Ametastegia</i> (c) <i>Archips podana</i> (great brown twist moth) (d) <i>Byturus tomentosus</i> (raspberry beetle)	Fumigation with Methyl bromide @ 32g/cubic metre for 2 hrs at 21° C or above at NAP or equivalent thereof or any other treatment duly approved by the Plant Protection

				(e) <i>Epidiaspis leperii</i> (European pear scale) (f) <i>Grapholita funebrana</i> (red plum maggot) (g) <i>Orthosia cerasi</i> (common quaker) (h) <i>Peridroma saucia</i> (pearly underwing moth) (i) <i>Erwinia amylovora</i> (fireblight) (g) Apple stem pitting virus (apple Spy 227 epinasty & decline)	Adviser to the Govt. of India. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the Country of Origin/re-export
266.	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Douglas fir cone)	Wood without bark	(i) China (ii) North America	Free from : (a) <i>Dendroctonus pseudotsugae</i> (Douglas fir beetle) (b) <i>Bursaphenches xylophilus</i> (Pine wood nematode)	Fumigation with Methyl bromide at 48 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent thereof or heat treatment at 56°C (core temperature) for 30 minutes or any other treatment approved by Plant Protection Adviser. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.
				(iii) New Zealand	Free from: (a) <i>Hylastes ater</i> (Black pine bark) (b) <i>Hylotrupes bajulus</i> (House longhorn beetle) (c) <i>Otiorhynchus ovatus</i> (Strawberry root weevil) (d) <i>Pseudocoremia</i>

				<i>suavis</i> (e) <i>Heterobasidion annosum</i> (f) <i>Leptographium procerum</i> (White pine root decline) (g) <i>Ophiostoma piceae</i> (Vascular mycosis of oak) (h) <i>Phaeocryptopus gaeumannii</i> (Swiss needlecast)	other treatment approved by Plant Protection Adviser. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.
		(ii) Tissue culture plants	(i) USA	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus.	NIL
319	<i>Vitis vinifera</i> (Grape)	(i) Rooted stock/Bud wood (stem cuttings)/Saplings	Any Country	Free from: (a) Grapevine Phylloxera or vine louse ( <i>Viteus vitifoliae</i> , syn. <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> ) (b) Rust ( <i>Phakopsora vitis</i> ) (c) Dead arm ( <i>Cryptosporella viticola</i> syn. <i>Phomopsis viticola</i> ) (d) Cown gall ( <i>Agrobacterium vitis</i> ) (e) Gummosis ( <i>Pantoea agglomerans</i> ) (f) Hairy root ( <i>Agrobacterium rhizogenes</i> ) (g) Pierce's disease ( <i>Xylella fastidiosa</i> ) (h) Bacterial necrosis ( <i>Xylophilus ampelinus</i> ) (i) Grapevine viruses: Luteovirus, Nepovirus, Closterovirus,	(i) Post-entry quarantine for a period of one year. (ii) Import subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation in the Ministry of Agriculture.

			Trichovirus, Potyvirus.	
(ii) Fresh fruits for consumption	(i) Afghanistan	NIL	NIL	
	(ii) Australia	Free from: (a) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) (b) <i>Bactrocera tryoni</i> (Queensland fruit fly) (c) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (d) <i>Epiphyas postvittana</i> (light brown apple moth) (e) <i>Frankliniella occidentalis</i> (Western flower thrips) (f) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealy bug)	(a) Pest free area status for <i>Bactrocera tryoni</i> (Queensland fruit fly) and <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) Methyl bromide fumigation @ 40 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly and Queensland fruit fly or (c) Pre shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly and 0°C or below for 13 days; 0.55°C or below for 14 days; 1.1°C or below for 18 days plus in-transit refrigeration against Queensland fruit fly	

				fly
		(iii) Canada	Free from : (a) <i>Frankliniella occidentalis</i> (Western flower thrips) (b) <i>Peridroma saucia</i> (pearly underwing moth) (c) <i>Spodoptera frugiperda</i> (fall armyworm)	(a) Pest free area status for <i>Bactrocera tryoni</i> (Queensland fruit fly) and <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) Methyl bromide fumigation @ 40 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly and Queensland fruit fly or (c) Pre shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly and 0°C or below for 13 days; 0.55°C or below for 14 days; 1.1°C or below for 18 days plus in-transit refrigeration against Queensland fruit fly.

		(iv) Chile	<p>Free from :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale)</li> <li>(b) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly)</li> <li>(c) <i>Frankliniella occidentalis</i> (western flower thrips)</li> <li>(d) <i>Peridroma saucia</i> (pearly underwing moth)</li> <li>(e) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealybug)</li> <li>(f) <i>Selenaspis articulatus</i> (West Indian redscale)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pest free area status for <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or</li> <li>(b) Methyl bromide fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly or</li> <li>(c) Pre shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly</li> </ul>
		(v) China	<p>Free from :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale)</li> <li>(b) <i>Peridroma saucia</i> (pearly underwing moth)</li> <li>(c) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealybug)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pest free area status for <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or</li> <li>(b) MB fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly or</li> <li>(c) Pre shipment</li> </ul>

				cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly
	(vi) France	Free from :	(a) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) (b) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (c) <i>Frankliniella occidentalis</i> (Western flower thrips) (d) <i>Peridroma saucia</i> (pearly underwing moth) (e) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealybug) (f) <i>Lobesia botrana</i> (grape berry moth)	(a) Pest free area status for <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) Methyl bromide fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly or (c) Pre shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly

		(vii) Iran	(a) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) (b) <i>Lobesia botrana</i> (grape berry moth)	(a) Pest free area status for <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) Methyl bromide fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly or (c) Pre shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly
		(viii) Italy	Free from: (a) <i>Arabis mosaic virus</i> (hop barebine) (b) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) (c) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (d) <i>Frankliniella occidentalis</i> (Western flower thrips) (e) <i>Peridroma saucia</i> (pearly underwing moth) (f) <i>Phytonemus pallidus</i> (strawberry mite)	(a) Pest free area status for <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) Methyl bromide fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly or

				(g) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealybug) (h) <i>Lobesia botrana</i> (grape berry moth)	(c) Pre shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly
			(ix) New Zealand	Free from: (a) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) (b) <i>Calepitrimerus vitis</i> (grape leaf rust mite) (c) <i>Epiphyas postvittana</i> (light brown apple moth) (d) <i>Frankliniella occidentalis</i> (Western flower thrips) (e) <i>Panonychus citri</i> (citrus red mite) (f) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealybug) (g) <i>Pseudococcus longispinus</i> (long-tailed mealybug)	(a) Pest free area status for <i>Bactrocera tryoni</i> (Queensland fruit fly) and <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) Methyl bromide fumigation @ 40 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly and Queensland fruit fly or (c) Pre shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly and 0°C or below for 13

				days; $0.55^{\circ}\text{C}$ or below for 14 days; $1.1^{\circ}\text{C}$ or below for 18 days plus in-transit refrigeration against Queensland fruit fly
(x) South Africa	Free from: (a) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (b) <i>Ceratitis rosa</i> (Natal fruitfly) (c) <i>Frankliniella occidentalis</i> (western flower thrips) (d) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealybug) (e) <i>Scirtothrips aurantii</i> (South African citrus thrips)	(a) Pest free area status for <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) and <i>Ceratitis rosa</i> (Natal fruit fly) as per international standards or (b) Methyl bromide fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs at $21^{\circ}\text{C}$ or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly and Natal fruit fly (c) Pre-shipment cold treatment at $0^{\circ}\text{C}$ or below for 10 days; $0.55^{\circ}\text{C}$ or below for 11 days; $1.1^{\circ}\text{C}$ or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly and Natal fruitfly.		
(xi) USA	Free from: (a) <i>Anastrepha fraterculus</i> (South American fruit fly) (b) <i>Aspidiotus nerii</i>	(a) Pest free area status for <i>Anastrepha fraterculus</i> (South American fruit fly)		

				<p>(aucuba scale)</p> <p>(c) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruitfly)</p> <p>(d) <i>Epiphyas postvittana</i> (light brown apple moth)</p> <p>(e) <i>Frankliniella occidentalis</i> (Western flower thrips)</p> <p>(f) <i>Panonychus citri</i> (citrus red mite)</p> <p>(g) <i>Peridroma saucia</i> (pearly underwing moth)</p> <p>(h) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealybug)</p> <p>(i) <i>Selenaspis articulatus</i> (West Indies red scale)</p>	<p>fly) and <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or</p> <p>(b) Methyl bromide fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly and Methyl bromide fumigation @ 40 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against <i>Anastrepha fraterculata</i> or</p> <p>(c) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; at 0.55°C or below for 11 days; at 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly and at 0.55°C or below for 18 days; at 1.1°C or below for 20 days plus in-transit refrigeration against <i>Anastrepha fraterculata</i></p>
--	--	--	--	--	---

		(xii) Egypt	Free from:- (a) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) (b) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (c) <i>Harmonia axyridis</i> (harlequin lady bird) (d) <i>Lobesia botrana</i> (grape berry moth) (e) <i>Otiorhynchus</i> <i>sulcatus</i> (vine weevil) (f) <i>Brevipalpus lewisi</i> (citrus flat mite) (g) <i>Phytophthora</i> <i>cryptogea</i> (tomato foot rot) (h) Grapevine fan leaf virus (grapevine court-noue virus) (i) Peach rosette mosaic virus (rosette mosaic of peach) (j) Tomato ringspot virus (ringspot of tomato)	(a) Pest free area status for <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) Methyl bromide fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly or (c) Pre shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly and 0°C or below for 13 days; 0.55°C or below for 14 days; 1.1°C or below for 18 days. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of Origin/ re-export.
		(xiii) Morocco	Free from:- (a) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) (b) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (c) <i>Lobesia botrana</i>	(a) Pest free area status for <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards

				(grape berry moth) (d) <i>Peridroma saucia</i> (pearly underwing moth) (e) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealy bug) (f) Grapevine fan leaf virus (grapevine court-noue virus)	or (b) Methyl bromide fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly or (c) Pre shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly and 0°C or below for 13 days; 0.55°C or below for 14 days; 1.1°C or below for 18 days. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of Origin/ re-export
	(iii) Raisins (dried grapes) for consumption	Any Country			Fumigation with Methyl bromide @ 16 g /cu. m for 24 hrs at 21°C and above at NAP and treatment shall be endorsed on phytosanitary certificate or by any other fumigant/ substance in the manner approved by the Plant

					Protection Adviser for this purpose
	(iv) Seeds (dried) for medicinal use	France	NIL		<p>(a) Weed free crop/ area certification or</p> <p>(b) Zero dockage certification in respect of quarantine weed seeds in the Phytosanitary Certificate</p> <p>or</p> <p>(c) Devitalization of seed by heat treatment at 120°C for 15 minutes or any other equivalent treatment approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India, and</p> <p>(ii) Management of handling, transportation, milling and processing of import consignment and manner of disposal refuse as per the guidelines prescribed by the Plant Protection Adviser to the Government of India</p>
345.	<i>Catharanthus roseus</i> (Vinca)	Seeds for sowing	(i) Australia	NIL	Free from quarantine weed seeds.
			(ii) Guatemala	NIL	Free from quarantine weed seeds and soil.
355.	<i>Cynodon dactylon</i> (lawn)	(i) Seed for sowing	(i) UK (ii) Australia	NIL	Free from quarantine weed

	grass)				seeds
	<i>Cynodon dactylon</i> (Bermuda grass)	(ii) Grass for propagation	(i) USA	Free from : - (a) <i>Chaetocnema pulicaria</i> (corn flea beetle) (b) <i>Belonolaimus longicaudatus</i> (sting nematode) (c) <i>Tylenchorhynchus acutus</i> (stylet-stunt nematode) (d) <i>Clavibacter xyli</i> subsp. <i>cynodontis</i> (Bermuda grass stunting disease)	(i) Free from quarantine weed seeds / plant and soil. (ii) Post- entry quarantine for a period of 9 months
			(ii)Indonesia	NIL	(i) Free from soil and quarantine weed seeds/ plant and soil. (ii) Post- entry quarantine for a period of 9 months
383.	<i>Olea europaea</i> (Olive)	(i) Dried leaves for consumption	Morocco	Free from: (a) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) (b) <i>Epidiaspis leperii</i> (European pear scale) (c) <i>Saturnia pyri</i> (giant emperor moth) (d) <i>Zeuzera pyrina</i> (leopard moth)	Fumigation with Methyl bromide @ 32 g/cu. m at 21°C and above or equivalent thereof under NAP and the treatment to be endorsed on phytosanitary certificate or by any other fumigant/ substance in the manner approved by the Plant Protection Adviser.
		(ii) Plants for propagation	Spain	Free from: (a) <i>Acherontia atropos</i> (death's Head Hawkmoth) (b) <i>Apate monachus</i> (black borer) (c) <i>Epidiaspis leperii</i> (European pear	Post-entry quarantine growing for a period of 60 days.

			scale) (d) <i>Euzophera pinguis</i> (olive moth) (e) <i>Hylesinus varius</i> (bark beetle) (f) <i>Lasioptera berlesiana</i> (g) <i>Otiorhynchus armadillo</i> (armadillo weevil) (h) <i>Otiorhynchus cribricollis</i> (apple weevil) (i) <i>Phloeotribus scarabaeoides</i> (olive bark beetle) (j) <i>Prays oleae</i> (olive kernel borer) (k) <i>Saturnia pyri</i> (giant emperor moth) (l) <i>Zeuzera pyrina</i> (leopard moth) (m) <i>Pezicula alba</i> (bark canker) (n) aster yellows phytoplasma group (o) <i>Pseudomonas savastanoi</i> <i>pv. savastanoi</i> (oleander knot)	
	(iii) Fruit For consumption/processing	Spain	Free from :- (a) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (b) <i>Epidiaspis leperii</i> (European pear scale) (c) <i>Lobesia botrana</i> (grape berry moth) (d) <i>Prays oleae</i> (olive kernel borer) (e) <i>Phaeoacremonium aleophilum</i> (Petri disease)	(a) Pest free status for <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) Methyl bromide fumigation @ 32g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly.

					(c) Pre-shipment cold treatment at $0^{\circ}\text{C}$ or below for 10 days; $0.55^{\circ}\text{C}$ or below for 11 days; $1.1^{\circ}\text{C}$ or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the Country of Origin/re-export.
387.	<i>Portulaca spp.</i>	Seeds for sowing	(i) Australia	Free from tobacco rattle virus (spraing of potato)	(i) Freedom from soil and quarantine weed seeds. (ii) Crop inspection and certification for freedom from tobacco rattle virus.
			(ii) UK	Free from :- (a) <i>Duponchelia fovealis</i> (Southern European marshland pyralid) (b) <i>Peridroma saucia</i> (pearly underwing moth) (c) <i>Phytonemus pallidus</i> (strawberry mite)	Free from quarantine weed seeds and soil.
			(iii) Japan	Free from :- (a) <i>Peridroma saucia</i> (pearly underwing moth) (b) <i>Phytonemus pallidus</i> (strawberry mite)	Free from quarantine weed seeds and soil.

405.	<i>Verbena spp.</i>	Seeds for sowing	(i) Australia	NIL	Free from quarantine weed seeds.
			(ii) Guatemala	NIL	Free from quarantine weed seeds and soil.
406.	<i>Viola spp.</i> (Pansy)	Seeds for sowing	(i) Australia	Free from: (a) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (bacterial leaf blight of tomato) (b) Tobacco rattle virus	(i) Freedom from quarantine weed seeds. (ii) Crop inspection and certification for freedom from tobacco rattle virus.
			(ii) Guatemala	Free from :- (a) <i>Peridroma saucia</i> (pearly underwing moth) (b) <i>Spodoptera frugiperda</i> (fall armyworm)	Free from quarantine weed seeds and soil.
418.	<i>Hylocereus undatus</i> (Dragon fruit)	Fresh fruit for consumption	(i) Sri Lanka (ii) Thailand	NIL	Free from soil.
	<i>Hylocereus Polyrhizus</i> (Dragon fruit Plants)	Stems/ Cuttings/ Plants for Propagation	Malaysia	NIL	(i) Free from soil (ii) Post entry quarantine for a growing period of 6-9 months.
419.	<i>Impatiens spp.</i> (Impatiens)	(i) Plants for propagation	(i) USA	Free from: (a) <i>Frankliniella occidentalis</i> (western flower thrips) (b) <i>Hercinothrips femoralis</i> (banded greenhouse thrips) (c) <i>Otiorhynchus sulcatus</i> (vine weevil) (d) <i>Phytonemus pallidus</i> (strawberry mite) (e) <i>Rhizobium rhizogenes</i> (f) Clover yellow vein virus (CYVV)	(i) Free from soil. (ii) Post entry quarantine for a period of 45 days.

			(g) Impatiens necrotic spot virus (TSWV-I)		
		(ii) The Netherlands	Free from: (a) <i>Frankliniella occidentalis</i> (western flower thrips) (b) <i>Otiorhynchus sulcatus</i> (vine weevil) (c) <i>Phytonemus pallidus</i> (strawberry mite) (d) Clover yellow vein virus (CYVV) (e) Impatiens necrotic spot virus (TSWV-I)	(i) Free from soil. (ii) Post entry quarantine for a period of 45 days.	
	(ii) Tissue culture plants	(i) USA (ii) The Netherlands	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from clover yellow vein virus (CYVV) and impatiens necrotic spot virus (TSWV-I) viruses.	NIL	
	<i>Impatiens spp.</i>	Seeds for sowing	Guatemala	NIL	
484.	<i>Mangifera indica</i> (Mango)	(i) Cuttings/ grafts/ budwood/ rooted plants for propagation	(i) Brazil	Free from: (a) <i>Apate monachus</i> (black borer) (b) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) (c) <i>Asterolecanium pustulans</i> (d) <i>Atta</i> spp. (leaf cutting ants ) (e) <i>Crematogaster brevispinosa</i> (f) <i>Euschistus heros</i> (g) <i>Horiola picta</i> (cocoa podhopper) (h) <i>Hypothenemus eruditus</i> (i) <i>Pseudococcus jackbeardsleyi</i> (Jack)	(i) Free from soil (ii) Commercial imports subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation (iii) Post-entry quarantine growing for 6-9 month.

			Beardsley mealybug) (j) <i>Rhynchophorus palmarum</i> (k) <i>Selenaspis articulatus</i> (l) <i>Sclerotium coffeicola</i> (m) <i>Rhizobium rhizogenes</i>	
			(ii) Cuba Free from: (a) <i>Apate monachus</i> (black borer) (b) <i>Asterolecanium pustulans</i> (c) <i>Atta insularis</i> (d) <i>Diaprepes splengleri</i> (e) <i>Ischnaspis longirostris</i> (f) <i>Mycetaspis personata</i> (g) <i>Pachnaeus litus</i> (h) <i>Paracoccus marginatus</i> (i) <i>Protopulvinaria mangiferae</i> (j) <i>Pseudococcus jackbeardsleyi</i> (Jack Beardsley mealybug) (k) <i>Rhynchophorus palmarum</i> (l) <i>Selenaspis articulatus</i> (red scale) (m) <i>Vinsonia stellifera</i> (stellate scale) (n) <i>Oligonychus yothersi</i> (avocado mite) (o) <i>Cercospora mangiferae</i> (leaf spot)	(i) Free from soil (ii) Commercial imports subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation (iii) Post-entry quarantine growing for 6-9 month.
			(iii) Niger Free from: (a) <i>Apate monachus</i> (black borer) (b) <i>Cryptophlebia leucotreta</i>	(i) Free from soil (ii) Commercial imports subject to prior approval of Department of

			(c) <i>Hoplolaimus pararobustus</i> (lance nematode)	Agriculture and Cooperation (iii) Post-entry quarantine growing for 6-9 month.
	(iv) Nigeria	Free from: (a) <i>Anoplocnemis curvipes</i> (b) <i>Apate monachus</i> (black borer) (c) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) (d) <i>Bathycoelia thalassina</i> (e) <i>Cryptophlebia leucotreta</i> (f) <i>Helopeltis schoutedeni</i> (g) <i>Pachnoda interrupta</i> (chafer beetle) (h) <i>Planococcoides njalensis</i> (i) <i>Scirtothrips aurantii</i> (citrus thrips) (j) <i>Selenaspidus articulatus</i> (red scale) (k) <i>Hoplolaimus pararobustus</i>	(i) Free from soil (ii) Commercial imports subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation (iii) Post-entry quarantine growing for 6-9 month.	
(ii) Plants for Propagation	(i) Thailand	Free from :- (a) <i>Bactrocera papayae</i> (papaya fruit fly) (b) <i>Coptotermes curvignathus</i> (rubber termite)	(i) Pest free status for <i>Bactrocera papayae</i> (papaya fruit fly) as per international standards or Methyl bromide fumigation @ 32g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against	

					<i>Bactrocera papayae</i> (papaya fruit fly). The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the Country of Origin/re-export. and (ii) Free from soil (iii) Commercial imports subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation (iv) Post-entry quarantine growing for 6-9 month.
575.	<i>Gypsophila paniculata</i>	(i) Tissue culture plants	Israel	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus.	Post-entry quarantine for a period of 45 days.
		(ii) Stems/ Cuttings and Plants for propagation	Israel	Free from <i>Erysiphe buhrii</i>	(i) Post-entry quarantine for a growing period of 90 days. (ii) Free from soil.
		(iii) Seeds for sowing	Denmark	NIL	Free from quarantine weed seeds and soil."

(ii) after serial number 579 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be added:-

S.No.	Plant species	Category of plant material	Country of origin	Additional declarations required to be incorporated into Phytosanitary Certificate	Special conditions of import
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"580.	Chata edulis (Mira leaves)	Leaves for consumption purpose	Ethopia	NIL	Free from Soil.

581.	<i>Ermophila mitchelli</i>	Wood with and without bark	Australia	Free from : - <i>Bemisia tabaci</i> (B biotype) (silver leaf whitefly)	Fumigation with Methyl bromide at 48 g. per cubic meter for 24 hrs. at 21°C. and above or equivalent thereof or any other treatment duly approved by the Plant Protection Adviser to the Govt. of India. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the Country of Origin/re-export.
582.	<i>Anogeissus leiocarpus</i>	Dry plant material for medicinal/processing purpose	Costa Rica, Senegal, Burkano Faso	NIL	Free from quarantine weeds seeds and soil.
583.	<i>Digitalis spp.</i>	Seeds for sowing	Guatemala	NIL	Free from quarantine weeds seeds and soil.
584.	<i>Hypoestes spp.</i>	Seeds for sowing	Netherlands, Denmark and Germany	NIL	Free from quarantine weeds seeds and soil
585.	<i>Tillandsia spp.</i> (All related spp.) (Air born plants)	Plants for propagation	USA	Free from : - (a) <i>Nipaecoccus nipae</i> (spiked mealybug) (b) <i>Unaspis citri</i> (citrus snow scale)	(i) Post Entry Quarantine for a growing period of 60 days. (ii) Free from Soil.
586.	<i>Sterlinga- S. Latifolia</i>	Dry flowers for decoration	Australia	Free from <i>Pineus pini</i> (pine woolly aphid)	Free from Quarantine weed seeds and soil
587.	<i>Momo inula paniculata</i>	Dry flowers for decoration	Thailand	NIL	Free from Quarantine weed seeds and soil.
588.	<i>Tithonia</i>	Dry flowers for decoration	Australia	NIL	Free from Quarantine weed seeds and soil.
589.	<i>A. daisy Ixodia achilleoids</i>	Dry flowers for decoration	Australia	NIL	Free from Quarantine weed seeds and soil.

590.	<i>Lomandra spp.</i>	Tissue cultured plants	Australia	Certified that the tissue cultured plants obtained from mother stock tested and maintained free from viruses.	NIL
591.	<i>Dianella spp.</i> (Native flax)	Tissue cultured plants	Australia	Certified that the tissue cultured plants obtained from mother stock tested and maintained free from viruses.	NIL
592.	<i>Datura alba</i>	Dry plant material (All plant parts) for medicinal purpose	China	NIL	Free from Quarantine weed seeds and soil
593.	<i>Aconitum napellus</i>	Dry plant material (All plant parts) for medicinal purpose	China	NIL	Free from Quarantine weed seeds and soil.
594.	<i>Salvia hispanica</i>	Seeds for sowing	Australia	NIL	Free from Quarantine weed seeds and soil.
595.	<i>Salvia spp.</i>	Seeds for sowing	Guatemala	Free from : (a) <i>Lygus lineolaris</i> (tarnished plant bug) (b) <i>Peridroma saucia</i> (pearly underwing moth) (c) <i>Pseudococcus jackbeardsleyi</i> (Jack Beardsley mealybug)	Free from Quarantine weed seeds and soil.
596.	<i>Asparagus racemosus</i> (Satavari pili)	Roots for medicinal purpose	China	NIL	Free from Quarantine weed seeds and soil.
597.	<i>Achillea millefolium</i>	Dry flowers for decoration	Thailand	NIL	Free from Quarantine weed seeds and soil."

[F-No-8-20/2005-PP-1]

Note: The Plant Quarantine (Regulation of import into India) Order, 2003 was published in the Gazette of India vide number S.O. 1322 (E) dated 18th November, 2003, subsequently amended vide number S.O.

PANKAJ KUMAR, Jt. Secy.

167(E) dated 6<sup>th</sup> February 2004, S.O. 427(E) dated 29<sup>th</sup> March, 2004, S.O. 644(E) dated 31<sup>st</sup> May 2004, S.O. 263(E) dated 25<sup>th</sup> February 2005, S.O. 462 (E) dated 31<sup>st</sup> March 2005, S.O. 1121 (E) dated 14<sup>th</sup> July 2006, S.O. 1353 (E) dated 31<sup>st</sup> July 2006, S.O. 1873 (E) dated 31<sup>st</sup> October 2006, S.O. 2074 (E) dated 6<sup>th</sup> December 2006, S.O. 2069 (E) dated 3<sup>rd</sup> December, 2007, S.O. 3(E) dated 31<sup>st</sup> December, 2007, S.O. 2847 (E) dated 8<sup>th</sup> December, 2008 and S.O. 2888 (E) dated 15<sup>th</sup> December, 2008.